

باب 10 خلوی دور اور خلوی تقسیم (Cell Cycle and Cell Division)

کیا آپ جانتے ہیں کہ سارے جاندار یہاں تک کہ ان میں سب سے بڑے، اپنی زندگی کی ابتداء ایک اکیلے خلیہ سے کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسے ایک اکیلا خلیہ بڑا جسم بناتا ہے۔ نمو اور تولید خلیے کی، حقیقت میں ہر جاندار کی خاصیت ہے۔ سبھی خلیوں کی پیدائش مادری خلیوں کے دو حصوں میں تقسیم ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ سارے نئے خلیے کی نمو اور تقسیم سے خلیوں کی آبادی بڑھتی ہے۔ خلیہ کی نمو اور تقسیم کا یہ دور کروڑوں خلیوں کو پیدا کرتا ہے۔

10.1 خلوی دور

9.2 ایم فیز

9.3 مائی ٹوسس کی

اہمیت

10.1 خلوی دور (Cell Cycle)

9.4 میوسس


9.5 میوسس کی اہمیت

سارے جاندار چیزوں میں خلوی تقسیم ایک بہت اہم عمل ہے۔ خلیہ کے تقسیم کے دوران DNA کی نقش ثانی (Replication) اور خلیہ کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ سارے عمل یعنی خلیہ کی تقسیم، DNA کی نقش ثانی اور خلیہ کی بڑھوتری کو باہمی ربط کے ساتھ ہونا ہوتا ہے تاکہ صحیح تقسیم ہو اور نئے خلیوں میں وہ ساری جینی خوبیاں موجود ہوں جو ان کے مادری خلیہ کو بتاتا ہے۔ وہ ترتیب جس سے ایک خلیہ کا جینوم (Genome) دوگنا ہو جاتا ہے، خلیہ کے لیے اور دوسری چیزیں بنتی ہیں اور خلیہ تقسیم ہو کر دو دختر خلیے بناتا ہے، خلوی دور (Cell Cycle) کہلاتا ہے۔ جب کہ نمو خلیہ (Cell Growth) ایک (Cytoplasmic Increase کے حساب سے) مسلسل عمل ہے۔ DNA کی تالیف (Synthesis) ایک خاص مرحلہ (Stage) میں ہی ہوتی ہے۔ نقش شدہ کروموزوم (DNA) پھر دختر خلیے کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں جو بہت ہی مشکل طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ سارے عمل جینی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔

10.1.1 خلیوں دور کے مرحلے

(Phases of Cell Cycle)

ایک عام یوکاریوٹی خلیوں دور کا مظاہرہ انسانی خلیہ کے کلچر (Culture) کے ذریعہ بخوبی ہوتا ہے۔ ان سبھی خلیوں کی تقسیم لگ بھگ ہر 24 گھنٹے میں ایک بار ہوتی ہے (شکل 10.1)۔ حالانکہ خلیوں دور کی الگ الگ جانداروں اور الگ الگ قسم کے خلیہ میں الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے Yeast میں خلیوں دور کا وقفہ تقریباً 90 منٹ ہوتا ہے۔ خلیوں دور دو ابتدائی حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔



شکل 10.1 خلیوں دور کا خاکہ جس میں ایک خلیہ سے دو خلیے کو بنتے دکھایا جا رہا ہے

• میٹوسس فیز (Mitosis Phase)

• انٹرفیز (Inter Phase)

ایم فیز (M Phase) دراصل خلیہ کی صحیح تقسیم یا خیطی تقسیم (Mitosis) کو بناتا ہے اور انٹرفیز دو لگاتار ایم فیز کے بیچ کے حصہ کو بتاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ 24 گھنٹے میں جو کہ انسان کے خلیوں دور کا وقفہ اوسط وقفہ ہے، خلیہ کا تقسیم صرف ایک گھنٹہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ انٹرفیز (Inter Phase) خلیوں دور کے مکمل اوقات کا 95 فی صدی سے زیادہ وقت لیتا ہے۔

ایم فیز مرکزہ تقسیم کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس میں دختر کروموزوم الگ ہوتے ہیں (Karyokinesis) اور سائٹوپلازم کے تقسیم سائٹوکلیمینس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے انٹرفیز (Inter Phase) کو مرحلہ سکون (Resting phase) کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جس کے دوران خلیہ تقسیم کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس میں دونوں خلیہ کی بڑھوتری اور DNA کی نقش ثانی ہوتی ہے۔

Inter Phase کو پھر تین حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

• جی ون فیز (G1 Phase (Gap 1))

• ایس فیز (S Phase (Synthesis))

• جی ٹو فیز (G2 Phase (Gap 2))

G1 Phase - Mitosis اور DNA کی نقش ثانی کے بیچ کے درمیان کو کہتے ہیں، جی ون فیز (G1 Phase) کے دوران خلیہ Metabolically Active ہوتا ہے اور لگاتار اس کی بڑھوتری ہوتی ہے لیکن DNA کی نقش ثانی نہیں ہوتی ہے۔ ایس فیز (Synthesis Phase) کے دوران DNA کی نقش ثانی ہوتی ہے۔ اس وقت میں ایک خلیہ کے DNA کی مقدار دوگنی ہو جاتی ہے۔ اگر شروع میں DNA کی مقدار 2C ہو تو یہ بڑھ کر 4C ہو جاتی ہے۔ لیکن کروموزوم کی تعداد (Chromosome Number) میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر خلیہ کے اندر G1 Phase میں کروموسوم (Chromosomes) کا عدد 2n ہو تو ایس فیز (S Phase) کے بعد بھی 2n Chromosomes ہی ہوتا ہے۔

پودے اور جانور کس طرح زندگی بھر نمو پاتے ہیں؟ کیا پودوں میں تمام خلیے ہر وقت تقسیم ہوتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پودوں اور جانوروں کے تمام خلیوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا آپ اعلیٰ پودوں میں ان خطوں کا نام اور بافت کی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں خلیے زندگی بھر تقسیم ہوتے رہتے ہیں؟ کیا جانوروں میں بھی اسی طرح کی میٹامورفیک بافت ہوتے ہیں؟

آپ نے پیاز کی جڑ کے سرے کے خلیوں میں خلوی تقسیم کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے ہر خلیے میں 14 کروموزوم ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خلیے میں G_1 فیز، S فیز اور M فیز کے بعد کتنے کروموزوم ہوں گے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ خلیے میں G_1 ، G_2 کے وقت ڈی این اے کی مقدار کیا ہوگی اگر M فیز کے بعد ڈی این اے کی مقدار 2C ہے؟

خلیہ حیوانات میں ایس فیز کے دوران جیسے ہی DNA کی نقش ثانی مرکزہ میں شروع ہوتی ہے ویسے ہی Cytoplasm, Centrioles میں نقش ثانی شروع کرتا ہے۔ G_2 فیز کے دوران Mitosis شروع ہونے کے لیے Proteins بنتا ہے جبکہ خلیہ کی بڑھوتری جاری رہتی ہے۔

کچھ بالغ حیوانات کے خلیے میں تقسیم ظاہر نہیں ہوتا ہے، جیسے خلیہ دل (Heart Cells) میں اور بہت سارے خلیے جس میں تقسیم اتفاقاً ہوتا ہے جیسے کی خلیے کے خاتمہ یا زخمی ہونے کی وجہ سے غائب خلیہ کو تبدیل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کا خلیہ جس میں تقسیم نہیں ہوتی وہ G_1 Phase کو چھوڑ کر ایک Incutive Stage میں داخل ہوتا ہے جسے Quiescent Stage (G_0) کہتے ہیں۔ خلیہ اس مرحلہ میں Metabolically Active ہوتا ہے لیکن اس کی بڑھوتری تب تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ جاندار چیزوں کی ضرورت نہ ہو۔ حیوانات میں Mitotic خلوی تقسیم صرف Diploid Somatic Cells میں ہوتا ہے اگرچہ اس میں بعض استثنائیں ہیں جب ہاپلوئیڈ سیل مائوس کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نر شہد کی مکھی۔ جب کی نباتات میں Haploid, Mitotic Divisions اور Diploid دونوں میں ہوتا ہے۔

10.2 ایم فیز (M Phase)

یہ خلوی دور کا بہت ہی اہم حصہ ہے جس کے دوران خلیہ میں سبھی Components اچھی طرح سے Reorganise ہو جاتا ہے۔ چونکہ Parent اور پروگنیسی (Progency) خلیے میں کروموزومس کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اسے تقسیم مساواتی بھی کہتے ہیں۔ پھر بھی آسانی کے لیے Mitosis کو چار حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خلیوں کا تقسیم ایک Progressive Process ہے۔ Karyokinesis کو چار مندرجہ ذیل حصوں میں ملا ہوتا ہے۔

- پرو فیز (Prophase)
- میٹا فیز (Metaphase)
- اینا فیز (Anaphase)
- ٹیلو فیز (Telophase)

10.2.1 پرو فیز (Prophase)

پرو فیز جو Karyokinesis کے Mitosis کا پہلا لمبا مرحلہ ہے، انٹر فیز کے S اور G_2 فیز کے درمیان آتا ہے۔ G_2 مرحلہ میں بنے نئے DNA مولیکولس بالکل صاف نہیں ہوتے مگر گتھے ہوتے ہیں۔ پرو فیز (Prophase) کی شروعات کروموزومس کے تکثیف (Condensation) سے ہوتا ہے۔ کرومٹین کے تکثیف کے عمل کے دوران کروموزومل اشیاء سلجھ کر سیدھی ہوتی ہے (شکل 10.2a)۔ Centrosome جس کا انٹر فیز کے ایس فیز (S Phase) کے دوران نقش ثانی ہوتا ہے، اب خلیہ کے الٹے قطب (Opposite Poles) کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ پرو فیز کے مکمل ہونے کو مندرجہ ذیل خوبیوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

- کروموزوم دو کرومیٹڈ (Chromatids) کا بنا ہوتا ہے جو سینٹر ویر (Centromere) سے جڑا ہوتا ہے۔ کروموسم سینٹر ویر پر دو منسلک کرومیٹڈ کے ملنے پر تشکیل پاتے ہیں۔
- اس عمل میں Mitotic Spindle کے ملنے کی شروعات، Microtubules اور خلیے کے سائٹوپلازم کا پروٹینی عوامل مدد کرتا ہے۔ سینٹر ویر جو انٹرفیز کے دوران ایسی نقل بناتے ہیں خلیوں کے مخالف لوگوں کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ ہر سینٹر ویر مائیکروٹیوبلس کو پھیلاتا ہے اسے ایسٹرس (Astesrs) کہتے ہیں۔ دوائسٹرس spindle fibers کے ساتھ مل کر میٹونک ایپٹرس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پروٹیز کے خاتمہ کے دوران اگر خلیہ کو خوردبین میں دیکھا جائے تو اس میں اینڈوپلازمک Nucleolus, Reticulum, Golgi Complexes اور Nuclear Envelope نہیں ہوتا ہے۔


10.2.2 میٹافیز (Metaphase)

نیوکلیئر اینولپ (Nuclear Envelope) کا پوری طرح خاتمہ ہونے کا مطلب مائٹوسس کا دوسرا فیز شروع ہونا ہے۔ اس دوران خلیہ کے سائٹوپلازم میں کروموزوم بکھرا ہوتا ہے۔ اس اسٹیج کے دوران کروموزوم پوری طرح کنڈینس ہو جاتا ہے اور اس دوران مائیکرواسکوپ کے ذریعے اسے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کروموزوم کی باہری بناوٹ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران میٹافیز کروموزوم دو Sister Chromatids کا بنا ہوتا ہے جو سینٹر ویر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے (شکل 10.2, b)۔ سینٹر ویر کی سطح پر جو چھوٹی چھوٹی ڈسک کی شکل کی بناوٹ ہوتی ہے اسے کائینیو کور (Kinetochores) کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کروموزوم اسپنڈل فائبرس سے جڑا ہوتا ہے (جو Microtubules کا بنا ہوتا ہے)۔ میٹافیز (Metaphase) کے دوران کروموزوم خط استواء پر سج جاتا ہے۔ دراصل ہر ایک کروموزوم کا ایک Chromatid جو اپنے کائینیو کور کے ذریعہ ایک قطب سے اور دوسرا کرومیٹڈ دوسرے قطب سے جڑا ہوتا ہے (شکل 10.2b)۔ میٹافیز میں کروموزوم کا پلین میں سجنا میٹافیز پلیٹ کہلاتا ہے۔ میٹافیز کی خصوصیت مندرجہ ذیل ہے:


- مائیکروٹیوبل (Microtubules)، کروموزومس کے کائینیو کور سے جڑا ہوتا ہے۔
- Spindle Equator کروموزومس کی طرف جاتا ہے اور میٹافیز پلیٹ پر اس طرح سج جاتا ہے کہ اس کا مائیکروٹیوبل اس کے دوران دونوں قطب (Poles) کی طرف ہوتا ہے۔

10.2.3 اینافیز (Anaphase)

اینافیز کے آغاز ہوتے ہی ہر ایک کروموزوم جو میٹافیز پلیٹ پر سجا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹوٹتا ہے اور یہ دو دختر کرومیٹڈ (Daughter Chromatids) جو مستقبل کے دختر مرکزہ (Daughter Nuclei) کا دختر کروموزوم (daughter chromosomes) ہے دو Opposite Poles




Early Prophase




Late Prophase

(a)




Transition to Metaphase



Metaphase

(b)

شکل 10.2 (a, b) مائٹوسس کے مختلف مرحلے کا ڈائیکرامٹک نظارہ



شکل 10.2 (c-e) مائٹوس کے مختلف مرحلے کا خاکہ

کی طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ اس میں ہر ایک کروموزوم Equatorial Plate سے دور ہوتا ہے اور ہر کروموزوم کا سینٹر میر قطب کی جانب ہوتا ہے جبکہ کروموزوم کا بازو (Arm) دوسری جانب (10.2c)۔ اینا فیز کو اس طرح اچھے سے سمجھا جاسکتا ہے۔

- Centromeres کا ٹوٹنا اور Chromatids کا الگ ہونا۔
- Chromatids کا Opposite Poles کی طرف جانا۔

10.2.4 ٹیلوفیز (Telophase)

Karyokinesis کے آخری اسٹیج یعنی ٹیلوفیز (Telophase) کے شروعات میں کروموزوم جو اپنے اپنے قطب پر ہوتا ہے وہ ڈکنڈینس ہو جاتا ہے اور اپنی انفرادیت ختم کر دیتا ہے۔ انفرادی کروموزوم بہت زیادہ دیر تک نہیں دیکھائی دیتا ہے اور Chromatin Material کا ہر جوڑا دونوں پول میں سے کسی ایک پول پر مجتمع ہو جاتا ہے (شکل 10.2d)۔ اس اسٹیج کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں:

- کروموزوم دو مخالف قطب پر جمع ہو جاتا ہے اور اس کی انفرادیت یا پہچان ختم ہو جاتی ہے۔
- کروموزوم کے کچھوں (Cluster) کے چاروں طرف Envelope کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر پول دو (Daughter Nuclei) بناتا ہے۔
- نیوکلیولس، گولجی کمپلیکس اور ER پھر سے بننے میں۔

10.2.5 سائٹو کائینیسس (Cytokinesis)

مائٹوس نہ صرف نقش شدہ کروموزوم (Duplicated Chromosomes) کو خلیہ دختر مرکزہ (Daughter Nuclei) میں الگ کرتا ہے بلکہ خود ہی اپنے آپ کو سائٹوپلازم کی علیحدگی سے دو دختر خلیہ میں تقسیم کر لیتا ہے جسے سائٹو کائینیسس کہتے ہیں جس کے ختم ہوتے ہی سیل ڈویژن پورا ہو جاتا ہے (شکل 10.2e)۔ حیوانات کے خلیہ میں Plasma Membrane میں Furrow کے بننے کے ذریعہ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ Furrow دھیرے دھیرے گہرا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں مرکز میں ایک دوسرے سے مل کر سیل سائٹوپلازم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پودوں کے خلیہ سخت سیل وال سے گھرے ہوتے ہیں اس لیے اس میں ایک الگ طریقہ کار کے ذریعہ سائٹو کائینیسس ہوتا ہے۔ نبتی خلیہ میں دیوار کا بننا خلیہ کے مرکز سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے باہر کی طرف بڑھ کر کنارے والی دیوار (Lateral Walls) سے مل جاتا ہے۔ Simple Precursor کے بننے کے ساتھ ساتھ نئے خلوی دیوار کا بننا بھی شروع ہوتا ہے جسے خلوی پلیٹ کہتے ہیں جو دو متصل خلیہ کے دیوار کے درمیان

Middle Lamella کو ظاہر کرتا ہے۔ پلازمک ڈویژن کے وقت عضویچہ (Organelles) جیسے مائٹوکونڈریا اور پلاسٹڈ کا بٹارا دو دختر خلیہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ جانداروں میں صرف سائیکوکانیسس ہوتا ہے پر Karyokinesis نہیں جس کی وجہ سے کثیر مرکزہ حالت (Multinucleate Condition) پیدا ہوتی ہے جو سن سائٹیم (Syncytium) کی تشکیل کرتا ہے (مثال: ناریل میں رقیق اینڈواسپرم)۔

10.3 مائی ٹوسس کی اہمیت (Significance of Mitosis)

مائی ٹوسس یا Equational Division صرف Diploid Cells میں ہی ہوتا ہے۔ کچھ Lower Plants اور Social Insects کے Haploid Cells میں بھی مائی ٹوسس ہوتا ہے۔ جاندار چیزوں کی زندگی میں اس تقسیم کی خوبیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مائی ٹوسس کے عمل میں آنے سے دو ڈپلائڈ دختر خلیہ وجود میں آتے ہیں جس کے ہر ایک خلیہ میں Genetic Complement برابر ہوتا ہے۔ کثیر خلوی جاندار کی بڑھوتری مائی ٹوسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

سیل گروتھ کی وجہ سے نیوکلیس اور سائٹوپلازم کے درمیان کی نسبت درہم برہم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے خلیہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرے تاکہ وہ نیوکلیس سائٹوپلازم کی نسبت کو بحال کر سکے۔ مائی ٹوسس کی ایک بہت ہی اہم حصہ داری خلیہ کے ٹوٹ پھوٹ کی مرمت میں ہے۔ اپنی ڈرمس کے اوپری سطح کی خلیہ، گٹ کی لائننگ اور خون کا خلیہ ہمیشہ نئے خلیہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔

10.4 میوسس (Meiosis)

صنعتی تولید (Sexual Reproduction) کے ذریعہ بچوں کی پیدائش میں دو زواجہ (Gametes) آپس میں ملتے ہیں جن میں سے ہر ایک زواجہ میں کروموزوم کے مکمل Haploid Set ہوتے ہیں۔ زواجہ کی تشکیل ایک خاص Diploid Cell سے ہوتی ہے۔ یہ خاص طرح کا خلوی تقسیم ہے جو کروموزوم کی تعداد کو آدھا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے یک گونہ دختر خلیہ (Haploid Daughter Cells) بنتے ہیں۔ اس قسم کے خلوی تقسیم کو میوسس کہتے ہیں۔ صنعتی تولید کرنے والے جاندار کے دور حیات میں میوسس Haploid فیز کی پیدا کاری کا تعین کرتا ہے جب کہ بار آور (Diploid Phase (Fertilisation) کو دوبارہ کرتا ہے۔ نباتات اور حیوانات میں Gametogenesis کے دوران Meiosis ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے Haploid Gamete بنتا ہے۔ میوسس کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہے۔

- میوسس کے اندر نیوکلیئر اور خلوی تقسیم کا دو سلسلہ وار دور ہوتا ہے جسے I میوسس اور II میوسس کہتے ہیں لیکن DNA Replication کا صرف ایک دور ہوتا ہے۔

- I میوسس کی شروعات S فیز میں Parental Chromosomes سے ایک جیسا Sister Chromatids کے بننے کے بعد ہوتا ہے۔

- میوسس کے دوران Homologous Chromosomes کے پینچ Pairing اور Homologous Chromosomes کے Non Sister Chromatids کے درمیان ان کے بیچ Recombination ہوتا ہے۔
- II میوسس کے ختم ہونے پر چار Haploid Cells بنتے ہیں۔ میوسس کو مندرجہ ذیل فیز میں بانٹا گیا ہے۔

میوسس II (Meiosis II)	میوسس I (Meiosis I)
پروفیز II	پروفیز I
میٹافیز II	میٹافیز I
اینافیز II	اینافیز I
ٹیلوفیز II	ٹیلوفیز I

10.4.1 میوسس I (Meiosis I)

پروفیز I: پہلی میوٹک تقسیم (Meiotic Division) کا پروفیز میوسس کے پروفیز کے بہ نسبت لمبا اور مشکل ہوتا ہے۔ اس کو کروموزوم کے برتاؤ کے مدح نظر سے پانچ حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ وہ یہ ہے: لیپوٹین (Leptotene)، ڈائگوٹین (Zygotene)، پیکٹیٹین (Pachytene)، ڈپلوٹین (Diplotene)، ڈائکائینس (Diakinesis)۔


Leptotene Stage کے دوران کروموزوم Light Microscope میں رفتہ رفتہ دکھائی دیتا ہے۔ پورے Leptotene کے دوران کروموزوم گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروفیز I کا دوسرا اسٹیج شروع ہے جسے Zygotene کہتے ہیں۔ اس اسٹیج کے دوران کروموزوم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے بنانا شروع کرتا ہے اور اس طرح جڑنے کے عمل کو Synapsis کہتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ جڑا ہوا Homologous Chromosomes کہلاتا ہے۔ اس اسٹیج کو جب Electron Microscope میں پڑھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ Chromosomes Synapsis ایک پیچیدہ ساخت کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جسے Synaptonemal Complex کہتے ہیں۔ ایک جوڑا Synapsed Homologous Chromosomes کے ملنے سے بنا ساخت ٹیڑا یا Bivalent کہلاتا ہے۔ اس کو اور بھی اچھی طرح دوسرے اسٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے۔ میوسس کے دو پہلے اسٹیج تیسرے اسٹیج جسے Pachytene کہتے ہیں کہ مقابلہ کم وقفہ کا ہوتا ہے اس اسٹیج کے دوران ہر Bivalent Chromosomes کے چار کروموسم میں سے ایک، ٹیڑا (Tetrads) کروموزوم کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس اسٹیج کی پہچان Recombination Nodules کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر Homologous Chromosomes کے Non-sister Chromatids کے بیچ Crossing Over ہوتا ہے۔ Crossing Over کے دوران Homologous Chromosomes کے Genetic Material کے

کا رد بدل ہوتا ہے۔ Crossing Over بھی ایک Enzyme Mediated Process ہے اور جو Enzyme کام کرتا ہے اسے Recombinase کہتے ہیں۔ Crossing Over دو Chromosomes پر Genetic Material کے Recombination کی نمائندگی کرتا ہے۔ Pachytene کے ختم ہوتے ہی Homologous Chromosomes کے بیچ کا Recombination پورا ہو جاتا ہے جہاں Crossing Over کے جگہ پر Chromosomes Linked ہوتا ہے۔ Cross Over کو چھوڑ کر Bivalents کے Recombined Homologous Chromosomes کا ایک دوسرے الگ ہونا اور Synaptonemal Complex کے Dissolution سے Diplotene کی شروعات کو پہچانا جاسکتا ہے۔ اس X شکل کی بناوٹ کو Chiasmata کہتے ہیں۔ کچھ Vertebrates کے Oocytes میں Diplotene کو ختم ہونے میں کئی مہینے اور سال لگتے ہیں۔

Chiasmata کے ختم ہوتے ہی Meiotic Prophase I کا آخری اسٹیج شروع ہوتا ہے جسے Diakinesis کہتے ہیں۔ اس فیز کے دوران کروموزوم پوری طرح کنڈینس ہو جاتا ہے اور Homologous Chromosomes کے الگ ہونے کے لیے Meiotic Spindle جمع ہو جاتا ہے۔ Diakinesis کے ختم ہوتے ہی نیوکلئس غائب ہو جاتا ہے اور Nuclear Envelope بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ Diakinesis کے ختم ہوتے ہی میٹافیز شروع ہو جاتا ہے۔

میٹافیز I (Metaphase I): اس فیز میں Equatorial Plate کروموزوم Bivalent پر سج جاتا ہے (شکل 10.3)۔ اسپنڈل کے Opposite Poles سے مائکروٹیوبولس ہومولوگس کروموزوم کے جوڑے سے جڑ جاتا ہے۔

اینافیز I (Anaphase I): اس فیز میں Homologous Chromosomes الگ ہو جاتا ہے جب کی Sister Chromatids اپنے Centromeres سے ہی جڑا ہوتا ہے (شکل 10.3)۔



شکل 10.3 میوسس I کے مراحل


ٹیلو فیز I (Telophase I): Nuclear Membrane اور Nucleolus پھر سے موجود ہو جاتا ہے۔ Cytokinesis جاری ہوتا ہے اور اسے Dyad of Cells کہتے ہیں (شکل 10.3)۔ یہاں تک کہ بہت سارے موقع پر کروموزوم ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اور انٹر فیز مرکزہ جو بہت ہی زیادہ پھیلا ہوتا ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دو Meiotic Division کے درمیان کے وقفہ کو Interkinesis کہتے ہیں اور اس کی زندگی زیادہ تر کم ہوتی ہے۔ انٹر کائنسس کے دوران DNA کا اپنی طرح کا دوسرا DNA نہیں بناتا ہے۔ Interkinesis کے فوراً بعد پروفیز II شروع ہوتا ہے I پروفیز کے مقابلہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔

10.4.2 میوسس II (Meiosis II)

پروفیز II (Prophase II): Cytokinesis کے ختم ہوتے ہی فوراً میوسس II شروع ہوتا ہے جو زیادہ تر کروموزوم کے پوری طرح بڑھنے سے پہلے ہوتا ہے۔ میوسس II عام مائٹوسس کی ہی طرح ہوتا ہے۔ پروفیز II کے ختم ہوتے ہی (شکل 10.4) Nuclear Membrane غائب ہو جاتا ہے۔ کروموزوم پھر سے گھٹے کی شکل میں (Compact) ہو جاتے ہیں۔

میٹافیز II (Metaphase II): اس مرحلہ میں کروموزوم خط استواء (Equator) پر سج جاتا ہے اور Spindle کے Opposite Poles سے Sister Chromatids Microtubules کے Kinetochores سے جڑ جاتا ہے (شکل 10.4)۔

اینافیز II (Anaphase II): یہ ہر ایک Chromosome کے Centromere کے ایک ساتھ ٹوٹنے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے جو Sister Chromatids کو ایک ساتھ بنائے رکھتا ہے اور خلیہ کے Opposite Poles کی طرف جانے کی اجازت دیتا ہے (شکل 10.4)۔ مائیکروٹیولیس چھوٹا ہو کر Kinetochores سے جڑا رہتا ہے۔



شکل 10.4 میوسس II کے مراحل

ٹیلوفیز II (Telophase II): ٹیلوفیز II کے ساتھ ہی میوسس ختم ہو جاتا ہے جس میں نیوکلیر اینوپلس کے ذریعہ کروموزوم کا دو جھنڈا ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ Cytokinesis جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے خلیہ کا ٹیڑیڈ بنتا ہے جو کہ چار پپلائیڈ دختر خلیہ بنتا ہے (شکل 10.4)۔

10.5 میوسس کی اہمیت (Significance of Meiosis)

میوسس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ ہر ایک اسپیس کے ہر صنفی تولید کرنے والے جاندار میں ہوتا ہے میوسس میں کروموزوم کی تعداد گھٹ کر آدھی ہو جاتی ہے جو صنفی تولید کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں جانداروں کی آبادی کے جینیاتی تغیر (Genetic Variability) کو بڑھاتا ہے۔ ارتقاء کے عمل کے لیے تغیر (Variation) کی بہت اہمیت ہے۔

خلاصہ

خلوی نظریہ کے مطابق ہر خلیہ پہلے سے موجود خلیہ سے ہی بنتا ہے۔ جس عمل سے ایسا ہوتا ہے اسے خلوی تقسیم کہتے ہیں۔ کوئی بھی صنفی تولید کرنے والے جاندار اپنی زندگی کی شروعات ایک اکیلا خلیہ ذائی گوٹ سے ہی کرتا ہے۔ خلوی تقسیم کسی جاندار کے پختہ ہو جانے کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ پوری زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ وہ مراحل جس کے ذریعہ خلیہ ایک ڈویژن (Division) سے دوسرے ڈویژن میں جاتا ہے اسے خلوی دور کہتے ہیں۔ خلوی دور کو دو فیئر میں بانٹا گیا ہے جسے (i) انٹرفیز۔ وہ وقت جب خلیہ تقسیم کے لیے تیار ہوتا ہے۔ (ii) مائٹوسس جو خلوی تقسیم کا صحیح وقت ہے کہتے ہیں۔ انٹرفیز کو پھر G1 اور S، G2 میں بانٹا گیا ہے۔ G1 فیئر وہ وقت ہے جب خلیہ بڑھتا ہے اور اس میں Normal Metabolism ہوتا ہے۔ اس فیئر میں زیادہ تر عضوے کی نقل ہوتی ہے۔ S فیئر میں DNA کروموزوم کی نقش ثانی ہوتی ہے۔ G2 فیئر سائٹوپلازم کے نمو کا وقفہ ہے۔ میٹوسس کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: (i) پرو فیئر (ii) مٹافیز (iii) انٹرفیز اور (iv) ٹیلوفیز ہے۔ پرو فیئر کے دوران کروموزوم کی تکثیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سینٹر پلس برعکس قطب کی طرف جاتا ہے۔ نیوکلیر اینوپلس اور مرکزہ غائب ہو جاتا ہے اور اسپنڈل فائبر دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ میٹافیز میں Equational Plate کروموزوم پر سج جاتا ہے۔ انٹرفیز کے دوران سینٹرومر کا تقسیم ہوتا ہے اور Chromatide دو Opposite Poles کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ جب Chromatids دو پولس پر پہنچتا ہے تب کروموزوم کا Elongation شروع ہوتا ہے اور Nuclear اور Nuclear Membrane پھر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سٹیج کو ٹیلی فیئر کہتے ہیں۔ Nuclear Division کے بعد Cytoplasmic Division سے شروع ہوتا ہے اور اسے Cytokinesis کہتے ہیں۔ اس لیے مائٹوسس کو Equational Division کہتے ہیں جس میں پیرینٹ کا کروموزوم نمبر، دختر خلیہ میں برقرار رہتا ہے۔

مائٹو کے برعکس Meiosis دوگنا خلیہ (Diploid Cells) میں ہوتا ہے جس کا مقصد Gametes بنانا ہے۔ اسے Reduction Division کہتے ہیں چونکہ اس میں کروموزوم نمبر گھٹ کر آدھا ہو جاتا ہے جب کہ یہ Gamete بناتا ہے۔ صنفی تولید میں جب دو زواجہ (Gamete) جڑتے ہیں تو اس کے کروموزوم کی تعداد Parent Cell کے برابر ہی برقرار رہتی ہے۔ میوسس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ میوسس I اور میوسس II پہلے Meiosis Division میں Homologous Chromosomes جڑ کر Bivalent بناتے ہیں اور Crossing Over ہوتا ہے۔ میوسس I میں پروٹینز لمبا ہوتا ہے جسے پھر پانچ حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ وہ یہ ہے Leptotene، Zygotene، Diplotene، Pachytene اور Metaphase Diakinesis میٹافیز I کے دوران Equatorial Bivalents پلیٹ پر سج جاتا ہے۔ اس کے بعد اینافیز I شروع ہوتا ہے جس میں کروموزوم اپنے دونوں Chromatids کے ساتھ Opposite Poles کی طرف جاتا ہے۔ ہر ایک قطب (Pole) Parent cell کا آدھا کروموزوم نمبر حاصل کرتا ہے۔ ٹیلی فیز I میں Nuclear Membrane اور Nucleolus پھر سے ظاہر ہوتا ہے۔ میوسس II، مائٹوسس کی طرح ہوتا ہے۔ اینافیز II کے دوران Sister Chromatids الگ ہو جاتا ہے۔ میوسس کے ختم ہونے پر چار Haploid Cells بنتے ہیں۔

مشق

- 1- پستان دار خلیہ کے خلوی دور میں اوسط کتنا وقت لگتا ہے؟
- 2- سائٹو کینسس (Cytokinesis) اور کیریو کینسس (Karyokinesis) میں فرق بتائیے۔
- 3- اینٹرفیز کے دوران ہونے والے واقعات کی وضاحت کریں۔
- 4- خلوی دور کے G_0 کوئی سینٹ فیز (quiescent phase) سے کیا سمجھتے ہیں؟
- 5- مائٹوسس کو مساوی تقسیم (Equational Division) کیوں کہا جاتا ہے؟
- 6- خلوی دور کہ اس مرحلہ کا نام بتائیں جن میں مندرجہ ذیل واقعہ ہوتے ہیں:
 - (i) کروموزوم برعکس قطب کے جانب جانے لگتے ہیں۔
 - (ii) سینٹرو میر ٹوٹے ہیں اور کرومیڈز الگ ہوتے ہیں۔
 - (iii) ہومولوگس کروموزوم کے درمیان جوڑا بنتے ہیں۔
 - (iv) ہومولوگس کروموزوم کے درمیان کراسنگ اوور (Crossing over) ہوتا ہے۔
- 7- مندرجہ ذیل کو دو سطروں میں بتائیں:

(i) سائٹو کینسس (Cytokinesis)	(ii) بائی ویلنٹ (Bivalent)	(iii) کیا سائٹا (Chiasmata)
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------
- 8- نباتی خلیہ کا سائٹو کائی نسس حیوانی خلیہ سے کس طرح الگ ہوتا ہے؟
- 9- پتہ لگائیں کہ میوسس کے کن کن مراحل میں چاروں دختر خلیے سائز میں برابر اور سائز میں الگ الگ ہوتے ہیں؟

- 10۔ مائٹوسس کے انافیز اور میوسس کے انافیز I میں فرق بتائیں؟
- 11۔ مائٹوسس اور میوسس کے درمیان خاص فرق بتائیں؟
- 12۔ میوسس کی کیا اہمیت ہے؟
- 13۔ اپنے استاد کے ساتھ ان پر بحث کریں:
- (i) یک گونہ (Haploid) کیڑے اور لوہور پودے (Lower Plants) جن میں خلوی تقسیم ہوتا ہے۔
- (ii) اونچے پودے (Higher Plants) کے چند گیگ گونہ خلیہ جن میں خلوی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔
- 14۔ کیا 'S' فیز میں DNA کے نقش شانی کے بغیر مائٹوسس ہو سکتا ہے۔
- 15۔ کیا خلوی تقسیم کے بغیر DNA کی ری پلکیشن (Replication) ممکن ہے۔
- 16۔ خلوی دور کے ہر مراحل کا تجزیہ کریں اور بتائیں کہ مندرجہ ذیل کس طرح بدلتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں۔
- (i) کروموزوم کی فی خلیہ تعداد (N)
- (ii) DNA کی فی خلیہ مقدار (C)