



5260CH08

تکملوں کا استعمال / اطلاق (APPLICATION OF INTEGRALS)

ہمیں ریاضی کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم ریاضی کے ذریعے ہی قدرت کو ہم آہنگ
شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ برک ہوف

تعارف (Introduction)




اے۔ ایل۔ کوچی (A.L. Cauchy)
(1789–1857)

جیومیٹری میں ہم بہت سی جیومیٹریائی اشکال جیسے مثلث، مستطیل، مخروط اور دائروں
کے رقبہ معلوم کرنے کے فارمولے پڑھتے ہیں۔ ریاضی کے استعمال میں اس طرح
کے فارمولے زندگی میں بہت سے حقیقی مسئلوں کے لیے بنیادی ہیں۔ بنیادی
جیومیٹری کے فارمولے ہمیں بہت سی آسان شکلوں کا رقبہ دریافت کرنے کے معاون
نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ منحنی سے گھرے ہوئے رقبہ کا حساب لگانے میں ناکافی ہیں۔
اس کے لیے ہمیں یہاں تکملی احصا کے تصور کی ضرورت ہوگی۔

پچھلے باب میں جب ہم تکملہ کی قدر انتہا کے حاصل جمع کے طور پر معلوم کر رہے
تھے۔ تو ہم نے منحنی $y = f(x)$ ، مختص $bx = a$ ، اور $x = -x$ محور سے گھرے ہوئے رقبہ کو نکالنے کے بارے میں پڑھا
ہے۔ یہاں، اس باب میں ہم تکملوں کے خاص استعمال کے بارے میں پڑھیں گے جس میں آسان منحنیوں کا رقبہ معلوم کرنا،
خطوط اور دائروں کے قوس کے درمیان کا رقبہ، مکانی اور ناقص (صرف معیاری شکل میں) شامل ہے۔

8.2 سادہ منحنیوں سے گھرا ہوا رقبہ (Area under Simple Curves)

پچھلے باب میں ہم نے معین تکملہ کو انتہا کے حاصل جمع کے طور پر پڑھا ہے اور کس طرح معین تکملہ کی قدر معلوم کی جاتی ہے یہ ہم



شکل 8.1

نے احصا کے بنیادی مسئلے کا استعمال کر کے سیکھا ہے۔ منحنی $y = f(x)$ - محور اور طولی مختص $x = a$ اور $x = b$ سے گھرے ہوئے رقبہ کو معلوم کرنے کے لیے اب ہم آسان اور وجدانی طریقے پر غور کریں گے۔ شکل 8.1 سے ہم منحنی کے زیر سایہ رقبہ جو کہ بہت زیادہ تعداد میں بہت تپلی عمودی پٹیوں سے بنا ہوا ہے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ایک اختیاری پتی جس کی اونچائی y اور

چوڑائی dx پر غور کیجیے، تب $dA = (بنیادی پتی کا رقبہ) y dx$ ، جہاں $y = f(x)$ ہے۔ یہ رقبہ ابتدائی رقبہ کہلاتا ہے جو کہ اختیاری پوزیشن پر علاقہ کے اندر واقع ہے اور جسے x کی کچھ خاص قدروں a اور b کے درمیان دکھایا گیا ہے۔

ہم x محور طولی مختص $x = a$ ، $x = b$ اور منحنی $y = f(x)$ کے درمیان واقع علاقہ کے کل رقبہ A کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، جو کہ نتیجتاً تپلی پٹیوں کے ابتدائی رقبوں کو جمع کر کے علاقہ $PQRSP$ سے ہو کر گزرتا ہے۔ علامتی طور پر ہم اس طرح ظاہر

$$A = \int_a^b dA = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx \quad \text{کرتے ہیں۔}$$


منحنی $y = x = g(y)$ ، محور اور خطوط $y = c$ ، $y = d$ سے گھرے ہوئے علاقہ

کا رقبہ اس طرح دیا گیا ہے

$$A = \int_c^d x dy = \int_c^d g(y) dy$$

یہاں ہم عرضی پٹیوں پر غور کرتے ہیں جیسا کہ شکل 8.2 میں دکھایا

گیا ہے۔




شکل 8.2

ریمارک (Remark): جس منحنی پر غور کیا جا رہا ہے اگر اس کی پوزیشن x


محور کے نیچے ہے، تب کیونکہ $x = a$ ، $f(x) < 0$ سے $x = b$ تک، جیسا کہ شکل 8.3 میں دکھایا گیا ہے، منحنی $-x$ - محور اور طولی مختص $x = a$ سے گھرا ہوا رقبہ منفی ہو جاتا ہے۔ لیکن، یہ صرف اس رقبہ کی عددی قدر ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس طرح، اگر رقبہ منفی

ہے، ہم اس کی مطلق قدر لیتے ہیں، یعنی، $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$




شکل 8.3

عام طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ منحنی کا کچھ حصہ $-x$ محور کے اوپر ہو اور کچھ $-x$ محور کے نیچے، جیسا کہ شکل 8.4 میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں، $A_1 < 0$ اور $A_2 > 0$ ہے۔ اس لیے، منحنی $y = f(x)$ ، $-x$ ، $y = f(x)$ ، $x = a$ اور $x = b$ سے گھرا ہوا رقبہ $A = |A_1| + A_2$ دیا گیا ہے۔



شکل 8.4



شکل 8.5

مثال 1: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ سے گھرے ہوئے علاقہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: شکل 8.5 سے مکمل رقبہ جو کہ دیے ہوئے دائرہ سے گھرا ہوا ہے (AOBA) علاقہ کا رقبہ جو کہ منحنی x محور اور طولی مختص $x = 0$ اور $(x = a)$ سے گھرا ہوا ہے

(کیونکہ دائرہ دونوں x -محور اور y -محور پر متشکل ہے)

$$= 4 \int_0^a y dx \quad (\text{عمودی پٹیاں لینے پر})$$

$$= 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

کیونکہ $y = \pm \sqrt{a^2 - x^2}$ ، $x^2 + y^2 = a^2$ دیتا ہے

کیونکہ AOBA علاقہ، پہلے ربع میں واقع ہے، y کو مثبت لیا گیا ہے۔ تکمیل کرنے پر، ہمیں وہ تمام رقبہ معلوم ہو جاتا ہے جو کہ دائرہ سے گھرا ہے

$$= 4 \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]_0^a$$

$$= 4 \left[\left(\frac{a}{2} \times 0 + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} 1 \right) - 0 \right] = 4 \left(\frac{a^2}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) = \pi a^2$$

متبادل کے طور پر، عرضی پٹیوں پر غور کرتے ہوئے جیسا کہ شکل 8.6 میں دکھایا گیا ہے، وہ تمام رقبہ جو کہ دائرہ کے حلقہ سے گھرا ہوا ہے۔

$$= 4 \int_0^a x dy = 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy \quad (\text{کیوں؟})$$

$$= 4 \left[\frac{y}{2} \sqrt{a^2 - y^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{y}{a} \right]_0^a$$

$$= 4 \left[\left(\frac{a}{2} \times 0 + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} 1 \right) - 0 \right]$$

$$= 4 \frac{a^2}{2} \frac{\pi}{2} = \pi a^2$$


مثال 2: ناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (ellipse) سے گھرا ہوا رقبہ

معلوم کیجیے

حل: شکل 8.7 سے، ناقص سے گھرے ہوئے علاقہ ABA'B'A کا رقبہ

$$= 4 \quad (\text{پہلے ربع میں منحنی } x, \text{ محور اور منحنی } x=a, x=0 \text{ سے گھرے ہوئے علاقہ AOBA کا رقبہ})$$

(کیونکہ ناقص دونوں x -محور اور y -محور کے متشکل ہے)




شکل 8.6

(عمودی پٹیاں لینے پر)

$$= 4 \int_0^a y dx$$

اب $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ، $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ دیتا ہے، لیکن کیونکہ علاقہ AOBA پہلے ربع میں واقع ہے، y کو مثبت لیا گیا

ہے۔ اس لیے، مطلوب رقبہ ہے




شکل 8.7

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= \frac{4b}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]_0^a \quad (\text{کیوں؟}) \\ &= \frac{4b}{a} \left[\left(\frac{a}{2} \times 0 + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} 1 \right) - 0 \right] \\ &= \frac{4b}{a} \frac{a^2}{2} \frac{\pi}{2} = \pi ab \end{aligned}$$

متبادل کے طور پر، عرضی پٹیوں پر غور کرتے ہوئے جیسا کہ شکل

8.8 میں دکھایا گیا ہے، ناقص کا رقبہ برابر ہے



شکل 8.8


$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^b x dy = 4 \frac{a}{b} \int_0^b \sqrt{b^2 - y^2} dy \quad (\text{کیوں؟}) \\ &= \frac{4a}{b} \left[\frac{y}{2} \sqrt{b^2 - y^2} + \frac{b^2}{2} \sin^{-1} \frac{y}{b} \right]_0^b \\ &= \frac{4a}{b} \left[\left(\frac{b}{2} \times 0 + \frac{b^2}{2} \sin^{-1} 1 \right) - 0 \right] \\ &= \frac{4a}{b} \frac{b^2}{2} \frac{\pi}{2} = \pi ab \end{aligned}$$

8.2.1 ایک تختی اور ایک خط سے گھرے ہوئے علاقہ کا رقبہ

(The area of the region bounded by a curve and a line)

اس ذیلی سیکشن میں، ہم ایک خط اور دائرہ، ایک خط اور ایک مکائی، ایک خط اور ایک ناقص کے درمیان گھرے ہوئے علاقہ کا رقبہ معلوم کریں گے۔ اوپر بتائے ہوئے مختصروں کی مساواتیں اپنی صرف معیاری شکل میں ہی ہوں گی کیونکہ دوسری شکل میں

مسئلہ (Case) اس کتاب کی حدود سے باہر ہیں۔



شکل 8.9

مثال 3: منحنی $y = x^2$ اور خط $y = 4$ سے گھرے ہوئے علاقہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: کیونکہ دیا ہوا منحنی جو کہ مساوات $y = x^2$ سے ظاہر کیا گیا ہے ایک مکانی ہے جو کہ صرف y محور پر متشاکل ہے، اس لیے شکل 8.9 سے علاقہ AOB کا مطلوبہ رقبہ اس طرح دیا گیا ہے (منحنی، y محور اور خطوط $y = 0$ اور $y = 4$) سے گھرے ہوئے علاقہ

$$2 \int_0^4 x dy = \text{BOB کا رقبہ}$$

(کیوں؟)

$$= 2 \int_0^4 \sqrt{y} dy = 2 \times \frac{2}{3} \left[y^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{4}{3} \times 8 = \frac{32}{3}$$

یہاں، ہم نے عرضی پٹیاں لی ہیں جیسا کہ شکل 8.9 میں دکھایا گیا ہے۔

متبادل کے طور پر، AOB علاقہ کا رقبہ حاصل کرنے کے لیے

ہم عمودی پٹیوں پر غور کر سکتے ہیں جیسا کہ شکل 8.10 میں دکھایا گیا

ہے۔ اس کے آخر میں، ہم مساوات $x^2 = y$ اور $y = 4$ کو حل

کرتے ہیں جو $x = -2$ اور $x = 2$ دیتا ہے۔

اس طرح علاقہ AOB کو منحنی $y = x^2$ ، $y = 4$ اور طویل مختص


$x = -2$ اور $x = 2$ سے گھرے ہوئے علاقہ کے طور پر بیان

کیا جاسکتا ہے۔

اس لیے علاقہ AOB کا رقبہ

$$= \int_{-2}^2 y dx$$

$$(y \text{ کا مختص } P) - (y \text{ کا مختص } Q) = 4 - x^2$$



شکل 8.10


$$= 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx$$

$$= 2 \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 \left[4 \times 2 - \frac{8}{3} \right] = \frac{32}{3}$$

ریمارک (Remark) مندرجہ بالا مثالوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کسی خطہ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے عمودی پٹیوں یا عرضی پٹیوں میں سے کسی پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد، ہم ان دونوں میں سے کسی پر بھی غور کر سکتے ہیں، زیادہ اہمیت راسی پٹیوں کو دیں گے۔

مثال 4: پہلے ربع میں x محور، خط $y=x$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 32$ سے گھرے ہوئے حلقہ کا خطہ معلوم کیجیے۔

حل: دی ہوئی مساوات ہیں



$$(1) \dots\dots\dots y=x$$

$$(2) \dots\dots\dots x^2 + y^2 = 32 \quad \text{اور}$$

(1) اور (2) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ خط اور دائرہ

B(4,4) پر پہلے ربع میں ملتے ہیں شکل (8.11)۔ x محور پر BM عمود کھینچئے۔

اس لیے، مطلوبہ رقبہ = خطہ OBMO کا رقبہ + خطہ BMAB کا رقبہ

اب، خطہ OBMO کا رقبہ

$$= \int_0^4 y dx = \int_0^4 x dx$$

$$= \frac{1}{2} [x^2]_0^4 = 8$$

دوبارہ، خطہ BMAB کا رقبہ

$$= \int_4^{4\sqrt{2}} y dx = \int_4^{4\sqrt{2}} \sqrt{32 - x^2} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x \sqrt{32 - x^2} + \frac{1}{2} \times 32 \times \sin^{-1} \frac{x}{4\sqrt{2}} \right]_4^{4\sqrt{2}}$$

$$= \left(\frac{1}{2} 4\sqrt{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 32 \times \sin^{-1} 1 \right) - \left(\frac{4}{2} \sqrt{32-16} + \frac{1}{2} \times 32 \times \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= 8\pi - (8 + 4\pi) = 4\pi - 8$$


(4).....

(3) اور (4) کا مجموعہ کرنے پر ہمیں مطلوبہ رقبہ حاصل ہوتا ہے 4π

مثال 5: ناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ اور طویل مختص $x=0$ اور $x=ae$ سے گھری ہوئی جگہ کا رقبہ معلوم کیجیے، جہاں $b^2 = a^2(1-e^2)$

اور $e < 1$ ہے۔

حل: حلقہ BOB'RFSB کا مطلوبہ رقبہ ہے (شکل 8.12) ناقص اور قطاروں $x=ae$ اور $x=0$ سے گھرا ہوا ہے۔



شکل 8.12

یہ نوٹ کر لیجیے کہ حلقہ BOB'RFSB کا رقبہ برابر ہے

$$= 2 \int_0^{ae} y dx = 2 \frac{b}{a} \int_0^{ae} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= \frac{2b}{a} \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]_0^{ae}$$

$$= \frac{2b}{2a} \left[ae \sqrt{a^2 - a^2 e^2} + a^2 \sin^{-1} e \right]$$

$$= ab \left[e \sqrt{1 - e^2} + \sin^{-1} e \right]$$

مشق 8.1

- 1- خفی $y^2 = x$ اور خطوط $x = 1$ ، $x = 4$ اور x -محور سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 2- پہلے ربع میں $x = 4$ ، $x = 2$ اور $y^2 = 9x$ اور x -محور سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 3- پہلے ربع میں $y = 4$ ، $y = 2$ اور $x^2 = 4y$ اور y -محور سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 4- ناقص $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 5- ناقص $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 6- پہلے ربع میں x -محور، خط $x = \sqrt{3}y$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

7- خط $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ کے ذریعہ کاٹے گئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے چھوٹے حصے کا رقبہ معلوم کیجیے۔

8- $x = y^2$ اور $x = 4$ کے درمیان کا رقبہ خط $x = a$ سے دو برابر حصوں میں بانٹا گیا ہے، a کی قدر معلوم کیجیے۔

9- مکانی $y = x^2$ اور $y = |x|$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

10- خنی $x^2 = 4y$ اور خط $x = 4y - 2$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

11- خنی $y^2 = 4x$ اور خط $x = 3$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

درج ذیل سوال 12 اور 13 میں صحیح جوابات کا انتخاب کیجیے۔

12- پہلے ربع میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ اور خطوط $x = 0$ اور $x = 2$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ ہے

(A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D)

13- خنی $y^2 = 4x$ ، $-y$ ، محور اور خط $y = 3$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ ہے

(A) 2 (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{9}{3}$ (D)


8.3 دو منحنیوں کے درمیان رقبہ (Area between Two Curves)

وجدانی طور پر لینینٹر کی صحیح سمجھ سے مکمل ایک رقبہ معلوم کرنے کا عمل ہے، جس میں خطہ کے ابتدائی رقبہ کو لا تعداد چھوٹی چھوٹی پٹیوں میں کاٹا جاتا ہے اور پھر ان ابتدائی رقبوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ مان لیجیے ہمیں دو منحنی جو کہ $y = f(x)$ ، $y = g(x)$ جنہیں ظاہر کیا گیا ہے، جہاں، $[a, b]$ میں $f(x) \geq g(x)$ ہے جیسا کہ شکل 8.13 میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں ان دونوں منحنیوں کے نقطہ تقاطع $x = a$ اور $x = b$ سے دیے گئے ہیں جو کہ دونوں منحنیوں کی دی ہوئی مساوات سے y کی مشترک قدر لینے پر حاصل ہوئے ہیں۔

تمکملے کے ضابطہ کو شکل دینے کے لیے ابتدائی رقبہ کو عمودی پٹیوں کی شکل میں لینا زیادہ بہتر ہے (آسان ہے) جیسا کہ شکل (8.13) میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ابتدائی پٹیوں کی اونچائی $f(x) - g(x)$ ہے اور چوڑائی dx ہے اس طرح ابتدائی

رقبہ dA برابر ہے

$$dA = [f(x) - g(x)]dx$$



اور کل رقبہ A اس طرح لیا گیا ہے

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

متبادل کے طور پر،

$$A = [\text{مُحور اور خطوط } x = a, x = b \text{ سے گھرا ہوا رقبہ } y = f(x)]$$

$$- [\text{مُحور اور خطوط } x = a, x = b \text{ سے گھرا ہوا رقبہ } y = g(x)]$$


$$= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

اگر $[a, c]$ میں $f(x) \geq g(x)$ ہے اور $[c, b]$ میں $f(x) \leq g(x)$ ہے، جہاں $a < c < b$ ہے جیسا کہ شکل 8.14

میں دکھایا گیا ہے۔ تب منحنیوں سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ اس طرح لکھا جاسکتا ہے

$$\text{حلقہ BPRQB کا رقبہ} + \text{حلقہ ABCDA کا رقبہ} = \text{کل رقبہ}$$

$$= \int_a^c [f(x) - g(x)] dx + \int_c^b [g(x) - f(x)] dx$$



مثال 6: دو مکافوں $y = x^2$ اور $y^2 = x$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: ان دونوں مکافوں کے نقطہ تقاطع $O(0,0)$ اور $A(1,1)$ ہیں جیسا

کہ شکل 8.15 میں دکھایا گیا ہے۔

یہاں ہم $y^2 = x$ یا $y = \sqrt{x} = f(x)$ اور $y = x^2 = g(x)$ رکھ


سکتے ہیں، جہاں $[0,1]$ میں $f(x) \geq g(x)$ ہے۔

اس لیے، شیڈڈ خطہ کا مطلوبہ رقبہ ہے

$$= \int_0^1 [f(x) - g(x)] dx$$

$$= \int_0^1 [\sqrt{x} - x^2] dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$



مثال 7: دائرہ $x^2 + y^2 = 8x$ اور مکافی $y^2 = 4x$ کے درمیان اور $-x$ محور سے اوپر واقع خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: دائرہ کی دی ہوئی مساوات $x^2 + y^2 = 8x$ کو $(x-4)^2 + y^2 = 16$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح دائرہ کا

مرکز $(4,0)$ اور نصف قطر 4 ہے۔ اس کا مکافی $y^2 = 4x$ کے

ساتھ نقطہ تقاطع ہیں

$$x^2 + 4x = 8x$$


$$یا \quad x^2 - 4x = 0$$

$$یا \quad x(x-4) = 0$$

$$یا \quad x = 4, \quad x = 0$$

اس طرح، ان دونوں منحنیوں کے $-x$ محور کے اوپر نقطہ تقاطع

$O(0,0)$ اور $P(4,4)$ ہیں۔




شکل 8.16 سے خطہ OPQCO کا مطلوبہ رقبہ $-x$ محور کے اوپر دونوں منحنیوں کے درمیان ہے

$$= (\text{حلقہ PCQP کا رقبہ}) + (\text{حلقہ OCPO کا رقبہ})$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^4 y dx + \int_4^8 y dx \\
 &= 2 \int_0^4 \sqrt{x} dx + \int_4^8 \sqrt{4^2 - (x-4)^2} dx \quad (\text{کیوں؟}) \\
 &= 2 \times \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 + \int_0^4 \sqrt{4^2 - t^2} dt \quad \text{جہاں } x-4=t \quad (\text{کیوں؟}) \\
 &= \frac{32}{3} + \left[\frac{t}{2} \sqrt{4^2 - t^2} + \frac{1}{2} \times 4^2 \times \sin^{-1} \frac{t}{4} \right]_0^4 \\
 &= \frac{32}{3} + \left[\frac{4}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 4^2 \times \sin^{-1} 1 \right] = \frac{32}{3} + \left[0 + 8 \times \frac{\pi}{2} \right] = \frac{32}{3} + 4\pi = \frac{4}{3} (8 + 3\pi)
 \end{aligned}$$

مثال 8: شکل 8.17 میں AOB ناقص $9x^2 + y^2 = 36$ کا پہلے ربع میں ایک حصہ ہے جب کہ OA=2 اور OB=6 ہے۔
 قوس AB اور وتر AB کے درمیان رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: ناقص کی دی ہوئی مساوات $9x^2 + y^2 = 36$ کو $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ یا $\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور
 اس طرح اس کی تصویر جیسا کہ شکل 8.17 میں دیا گیا ہے، کی طرح ہے۔



شکل 8.17

اسی طرح، وتر AB کی مساوات ہے

$$y - 0 = \frac{6 - 0}{0 - 2} (x - 2)$$

$$y = -3(x - 2) \quad \text{یا}$$

$$y = -3x + 6 \quad \text{یا}$$

شیڈڈ خطہ کا رقبہ جیسا کہ شکل 8.17 میں دکھایا گیا ہے۔


(کیوں؟)

$$= 3 \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx - \int_0^2 (6 - 3x) dx$$

$$= 3 \left[\frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} \right]_0^2 - \left[6x - \frac{3x^2}{2} \right]_0^2$$

$$= 3 \left[\frac{2}{2} \times 0 + 2 \sin^{-1} (1) \right] - \left[12 - \frac{12}{2} \right] = 3 \times 2 \times \frac{\pi}{2} - 6 = 3\pi - 6$$

مثال 9: تکمل کا استعمال کر کے ایک مثلث سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جس کے راس (1,0)، (2,2) اور (3,1) ہیں۔



حل: مان لیجیے $A(1,0)$ ، $B(2,2)$ اور $C(3,1)$ مثلث ABC (شکل 8.18) کے راس ہیں۔

ΔAEC کا رقبہ - منحنف BDEC کا رقبہ + ΔABD کا رقبہ =

رقبہ = مثلث ABC کا رقبہ


اب ضلع AB، BC، اور CA کی مساوات بالترتیب اس طرح دی گئی ہیں

$$y = \frac{1}{2}(x-1), y = 4-x, y = 2(x-1)$$

اس طرح،

$$\begin{aligned} \Delta ABC \text{ کا رقبہ} &= \int_1^2 2(x-1) dx + \int_2^3 (4-x) dx - \int_1^3 \frac{x-1}{2} dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 + \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_2^3 - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 \\ &= 2 \left[\left(\frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1 \right) \right] + \left[\left(4 \times 3 - \frac{3^2}{2} \right) - \left(4 \times 2 - \frac{2^2}{2} \right) \right] - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{3^2}{2} - 3 \right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1 \right) \right] \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مثال 10: دو دائروں $x^2 + y^2 = 4$ اور $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کے درمیان بند خط کا رقبہ معلوم کیجیے۔



حل: دیے ہوئے دائروں کی مساوات ہیں

$$(1) \dots\dots\dots x^2 + y^2 = 4$$

$$(2) \dots\dots\dots (x-2)^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور}$$

مساوات (1) ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O مبدا پر ہے اور نصف قطر 2

ہے۔ مساوات (2) ایک دائرہ ہے جس کا مرکز C(2,0) ہے اور نصف قطر

2 ہے۔ مساوات (1) اور (2) کو حل کرنے پر ہمارے پاس ہے

$$(x-2)^2 + y^2 = x^2 + y^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 + y^2 \quad \text{یا}$$

یا $x=1$ ، جو $y = \pm\sqrt{3}$ دیتا ہے

اس طرح دیے ہوئے دائروں کے نقطہ تقاطع $A(1, \sqrt{3})$ اور $A'(1, -\sqrt{3})$ ہیں جیسا کہ شکل 8.19 میں دکھایا گیا ہے۔

دائروں کے درمیان درکار بند خطہ کا رقبہ OACA'O

$$\begin{aligned}
 &= 2 \text{ [علاقہ ODCAO کا رقبہ] (کیوں؟)} \\
 &= 2 \text{ [علاقہ DCAD کا رقبہ + علاقہ ODAO کا رقبہ]} \\
 &= 2 \left[\int_0^1 y dx + \int_1^2 y dx \right] \\
 &= 2 \left[\int_0^1 \sqrt{4 - (x-2)^2} dx + \int_1^2 \sqrt{4 - x^2} dx \right] \text{ (کیوں؟)} \\
 &= 2 \left[\frac{1}{2} (x-2) \sqrt{4 - (x-2)^2} + \frac{1}{2} \times 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) \right]_0^1 \\
 &\quad + 2 \left[\frac{1}{2} x \sqrt{4 - x^2} + \frac{1}{2} \times 4 \sin^{-1} \frac{x}{2} \right]_1^2 \\
 &= \left[(x-2) \sqrt{4 - (x-2)^2} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) \right]_0^1 + \left[x \sqrt{4 - x^2} + 4 \sin^{-1} \frac{x}{2} \right]_1^2 \\
 &= \left[\left(-\sqrt{3} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{-1}{2} \right) \right) - 4 \sin^{-1}(-1) \right] + \left[4 \sin^{-1} 1 - \sqrt{3} - 4 \sin^{-1} \frac{1}{2} \right] \\
 &= \left[\left(-\sqrt{3} - 4 \times \frac{\pi}{6} \right) + 4 \times \frac{\pi}{2} \right] + \left[4 \times \frac{\pi}{2} - \sqrt{3} - 4 \times \frac{\pi}{6} \right] \\
 &= \left(-\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} + 2\pi \right) + \left(2\pi - \sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} \right) \\
 &= \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

مشق 8.2

- 1- ایک دائرہ $4x^2 + 4y^2 = 9$ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ مکافی $x^2 = 4y$ کے اندر واقع ہے۔
- 2- منحنیوں $(x-1)^2 + y^2 = 1$ اور $x^2 + y^2 = 1$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

- 3- منحنیوں $y = x^2 + 2$ ، $y = x$ ، $x = 0$ اور $x = 3$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 4- تکمیل کا استعمال کر کے اس خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ ایک مثلث سے گھرا ہوا ہے اور مثلث کے راس $(-1, 0)$ ، $(1, 3)$ اور $(3, 2)$ ہے۔
- 5- تکمیل کا استعمال کر کے اس مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے جس کے ضلعوں کی مساوات $y = 2x + 1$ ، $y = 3x + 1$ اور $x = 4$ ہیں۔


ذیل سوال 6 اور 7 میں صحیح جوابات کا انتخاب کیجیے:

- 6- دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ اور خط $x + y = 2$ سے گھرا ہوا چھوٹا رقبہ ہے
- (A) $2(\pi - 2)$ (B) $\pi - 2$ (C) $2\pi - 1$ (D)
- 7- منحنیوں $y^2 = 4x$ اور $y = 2x$ کے درمیان واقع رقبہ ہے
- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D)

متفرق مثالیں

مثال 11: مکافی $y^2 = 4ax$ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ وتر خاص (Latus rectum) سے گھرا ہوا ہے۔

حل: شکل 8.20 سے، مکافی $y^2 = 4ax$ کا راس مبدأ $(0, 0)$ پر ہے۔ وتر خاص LSL' کی مساوات $x = a$ ہے۔ ساتھ



شکل 8.20

ہی مکافی x -محور پر متشکل ہے۔


خطہ $OLL'O$ کا مطلوبہ رقبہ

$=$ (خطہ $OLSO$ کا رقبہ) $= 2 \int_0^a y dx = 2 \int_0^a \sqrt{4ax} dx$

$$= 2 \int_0^a y dx = 2 \int_0^a \sqrt{4ax} dx$$

$$= 2 \times 2 \sqrt{a} \int_0^a \sqrt{x} dx$$

$$= 4\sqrt{a} \times \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^a$$



شکل 8.21

$$= \frac{8}{3} \sqrt{a} \left[a^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{8}{3} a^2$$

مثال 12: خط $y = 3x + 2$ ، محور اور طولی مختص $x = -1$ اور $x = 1$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: جیسا کہ شکل 8.21 میں دکھایا گیا ہے، خط $y = 3x + 2$ ،

$-x$ محور سے $x = \frac{-2}{3}$ پر ملتا ہے اور اس کا گراف $x \in \left(-1, \frac{-2}{3}\right)$

کے لیے $-x$ محور کے نیچے واقع ہے اور $x \in \left(\frac{-2}{3}, 1\right)$ کے لیے


$-x$ محور کے اوپر واقع ہے۔

مطلوبہ رقبہ = خطہ ACBA کا رقبہ + خطہ ADEA کا رقبہ

$$= \left| \int_{\frac{-2}{3}}^1 (3x + 2) dx \right| + \int_{-1}^{\frac{-2}{3}} (3x + 2) dx$$

$$= \left[\frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{\frac{-2}{3}}^1 + \left[\frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{6} + \frac{25}{6} = \frac{13}{3}$$

مثال 13: $x = 0$ اور $x = 2\pi$ کے درمیان منحنی $y = \cos x$ سے گھرے ہوئے خطہ کے رقبہ کو معلوم کیجیے۔




شکل 8.22

حل: شکل 8.22 سے مطلوبہ رقبہ = خطہ OABO کا رقبہ + خطہ

BCDB کا رقبہ + خطہ DEFD کا رقبہ

اس طرح، ہمارے پاس مطلوبہ رقبہ ہے

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \left| \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx \right| + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \cos x dx$$



$$= [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left| [\sin x]^{\frac{3\pi}{2}} \right| + [\sin x]^{\frac{2\pi}{2}}_{\frac{\pi}{2}}$$

مثال 14: ثابت کیجیے کہ منحنیوں $y^2 = 4x$ اور $x^2 = 4y$ ، مربع کا رقبہ جو کہ

$x = 0$ ، $x = 4$ ، $y = 0$ اور $y = 4$ سے گھرا ہوا ہے کو تین برابر حصوں میں تقسیم

کرتی ہیں۔

حل: ذہن نشین کر لیجیے کہ مکافیوں $y^2 = 4x$ اور $x^2 = 4y$ کے نقطہ تقاطع

$(0,0)$ اور $(4,4)$ ہیں جیسا کہ شکل 8.23 میں دکھایا گیا ہے۔

اب، خطہ OAQBO کا رقبہ جو کہ منحنیوں $y^2 = 4x$ اور $x^2 = 4y$ سے گھرا ہوا ہے

$$= \int_0^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{x^2}{4} \right) dx = \left[2 \times \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{12} \right]_0^4$$

$$= \frac{32}{3} - \frac{16}{3} = \frac{16}{3}$$

(1).....

دوبارہ، منحنیوں $x^2 = 4y$ ، $x = 0$ ، $x = 4$ اور $-x$ محور سے گھرے ہوئے خطہ OPQAO کا رقبہ

$$= \int_0^4 \frac{x^2}{4} dx = \frac{1}{12} [x^3]_0^4 = \frac{16}{3}$$

(2).....

اسی طرح منحنی $y^2 = 4x$ ، $-y$ محور، $y = 0$ اور $y = 4$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ

$$= \int_0^4 x dy = \int_0^4 \frac{y^2}{4} dy = \frac{1}{12} [y^3]_0^4 = \frac{16}{3}$$

(3).....

(1)، (2) اور (3) سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خطہ OAQBO کا رقبہ = خطہ OPQAO کا رقبہ =


خطہ OBQRO کا رقبہ، یعنی؛ مکافیوں $y^2 = 4x$ اور $x^2 = 4y$ سے گھرا ہوا رقبہ مربع کے رقبہ کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

مثال 15: خطہ $\{(x, y) : 0 \leq y \leq x^2 + 1, 0 \leq y \leq x + 1, 0 \leq x \leq 2\}$ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

حل: ہم سب سے پہلے اس خطہ کا نقشہ بناتے ہیں جس کا رقبہ معلوم کرنا ہے۔ یہ خطہ درج ذیل خطوں کا تقاطع ہے۔

$$A_1 = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x^2 + 1\}$$

$$A_2 = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x + 1\}$$



شکل 8.24

$$A_3 = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2\}$$

اور $y = x^2 + 1$ اور $y = x + 1$ کے نقطہ تقاطع $P(0,1)$ اور $Q(1,2)$ ہیں۔ شکل

8.24 سے، مطلوبہ خطہ OPQRSTO شیڈ خطہ ہے جس کا رقبہ ہے

خطہ TSRQT کا رقبہ + خطہ OTQPO کا رقبہ =

$$= \int_0^1 (x^2 + 1) dx + \int_1^2 (x + 1) dx \quad (\text{کیوں؟})$$

$$= \left[\left(\frac{x^3}{3} + x \right) \right]_0^1 + \left[\left(\frac{x^2}{2} + x \right) \right]_1^2$$

$$= \left[\left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 \right] + \left[(2 + 2) - \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] = \frac{23}{6}$$

باب 8 پر مبنی تفریق مشق

1- دی ہوئی منحنيوں اور دیے ہوئے خطوط سے گھرے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے:

(i) $y = x^2$ ، $x = 1$ ، $x = 2$ اور $-x$ محور

(ii) $y = x^4$ ، $x = 1$ ، $x = 5$ اور $-x$ محور

2- منحنيوں $y = x$ اور $y = x^2$ کے درمیان رقبہ معلوم کیجیے۔

3- اس خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ پہلے ربع میں واقع ہے اور $y = 4x^2$ ، $x = 0$ ، $y = 1$ اور $y = 4$ سے گھرا ہوا ہے۔

4- گراف $y = |x + 3|$ کا گراف بنائیے اور $\int_{-6}^0 |x + 3| dx$ کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔

5- منحنی $y = \sin x$ سے گھرے ہوئے اور $x = 0$ اور $x = 2\pi$ کے درمیان خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

6- مکانی $y^2 = 4ax$ اور خط $y = mx$ کے درمیان بند خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

7- مکانی $4y = 3x^2$ اور خط $2y = 3x + 12$ کے درمیان بند خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

8- چھوٹے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ ناقص $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ اور خط $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ سے گھرا ہوا ہے۔

9- چھوٹے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ ناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ اور خط $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ سے گھرا ہوا ہے۔

- 10- مکانی $x^2 = y$ ، خط $y = x + 2$ اور x -محور سے گھرے ہوئے بند خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 11- تکمیل کے طریقے کا استعمال کر کے منحنی $|x| + |y| = 1$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- (اشارہ: مطلوبہ خطہ (علاقہ) خطوط $x + y = 1$ ، $x - y = 1$ ، $x + y = 1$ اور $-x + y = 1$ سے گھرا ہوا ہے)
- 12- منحنیوں $\{(x, y) : y = |x| \text{ اور } y \geq x^2\}$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 13- تکمیل کے طریقے کا استعمال کر کے مثلث ABC کا رقبہ معلوم کیجیے، جس کے راسوں کے مختص $A(2, 0)$ ، $B(4, 5)$ اور $C(6, 3)$ ہیں۔
- 14- تکمیل کے طریقے کا استعمال کر کے اس خطہ کا رقبہ معلوم کیجیے جو خطوط $2x + y = 4$ ، $3x - 2y = 6$ اور $x - 3y + 5 = 0$ سے گھرا ہوا ہے۔
- 15- خطہ $\{(x, y) : y^2 \leq 4x, 4x^2 + 4y^2 \leq 9\}$ کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- مندرجہ ذیل سوال 16 تا 20 میں صحیح جوابات کا انتخاب کیجیے
- 16- منحنی $y = x^3$ ، x -محور اور طول مختص $x = -2$ اور $x = 1$ سے گھرا ہوا رقبہ ہے
- (A) -9 (B) $-\frac{15}{4}$ (C) $\frac{15}{4}$ (D) $\frac{17}{4}$
- 17- منحنی $y = x|x|$ ، x -محور اور طول مختص $x = -1$ اور $x = 1$ سے گھرا ہوا رقبہ ہے
- (A) 0 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{3}$
- 18- دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ کا وہ رقبہ جو مکانی $y^2 = 6x$ کے باہر ہے
- (A) $\frac{4}{3}(4\pi - \sqrt{3})$ (B) $\frac{4}{3}(4\pi + \sqrt{3})$ (C) $\frac{4}{3}(8\pi - \sqrt{3})$ (D) $\frac{4}{3}(8\pi + \sqrt{3})$
- 19- y محور، $y = \cos x$ اور $y = \sin x$ ، جہاں $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ سے گھرا ہوا رقبہ ہے
- (A) $2(\sqrt{2} - 1)$ (B) $\sqrt{2} - 1$ (C) $\sqrt{2} + 1$ (D) $\sqrt{2}$

خلاصہ (Summary)

♦ منحنی $y = (f(x))$ ، محور اور خطوط $x = a$ اور $x = b$ ($b > a$) سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ اس ضابطہ

$$\text{کی مدد سے دیا گیا ہے: } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx = \text{رقبہ}$$

♦ منحنی $x = \phi(y)$ ، محور اور خطوط $y = c$ ، $y = d$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ اس ضابطہ سے دیا گیا ہے۔

$$\text{رقبہ} = \int_c^d x dy = \int_c^d \phi(y) dy$$

♦ منحنیوں $y = f(x)$ ، $y = g(x)$ اور خطوط $x = a$ ، $x = b$ سے گھرے ہوئے خطہ کا رقبہ اس ضابطہ سے دیا گیا ہے

$$\text{رقبہ} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad \text{جہاں } [a, b] \text{ میں } f(x) \geq g(x)$$

♦ اگر $[a, b]$ میں $f(x) \geq g(x)$ ہے اور $[c, b]$ میں $f(x) \leq g(x)$ ، $a < c < b$ تب

$$\text{رقبہ} = \int_a^c [f(x) - g(x)] dx + \int_c^b [g(x) - f(x)] dx$$

تاریخ کے اوراق سے (Historical Note)

تکمل احصا کا اصل پچھلے زمانے میں ریاضی کی پیدائش کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پرانے زمانے کے یونانی (Greece) ریاضی دانوں کے خالی کرنے کے طریقے سے اس کا رشتہ ہے۔ ہموار شکلوں کے رقبہ، سطحی رقبہ اور ٹھوس اشیا کا حجم وغیرہ معلوم کرنے کے مسئلہ میں یہ طریقہ وجود میں آیا۔ اس سوچ سے خالی کرنے کے طریقے کو تکمل کا پہلا طریقہ مانا جاسکتا ہے۔ یوڈوکس (Eudoxus) (440BC) اور آرکیمیڈیز (Archimedes) (300BC) کے کام میں خالی کرنے کے طریقہ میں پرانے زمانے میں عظیم بدلاؤ آیا۔

احصا کی عبارت میں متشکل کا نظریہ سترھویں صدی میں شروع ہوا۔ 1665 میں نیوٹن نے احصا پر اپنا کام شروع کیا اور جسے اس نے فلکسن کی عبارت کا نام دیا اور اس نے اپنی اس عبارت کا استعمال ماس اور منحنی کے ایک

نقطہ پر انحصار کا نصف قطر معلوم کرنے کے لیے کیا۔ نیوٹن نے معکوس تفاعل کی بنیادی علامت سے متعارف کرایا جسے مخالف مشتق (غیر معین تکملہ) یا مماس کا معکوس طریقہ کہتے ہیں۔

لبنیٹز (Leibnitz) نے 1684-86 کے درمیان ایک مضمون ایلکٹرا وڈیٹوریم میں شائع کرایا جس کو اس نے کیکلوس کے خلاصہ کا نام دیا، کیونکہ یہ لامحدود چھوٹے رقبہ کے اعداد کے مجموعہ سے تعلق رکھتا تھا، جس کا مجموعہ، اس نے علامت 'ا' سے ظاہر کیا۔ 1696ء میں اس نے جے۔ برنولی (J. Bernoulli) کی صلاح پر عمل کیا اور اس مضمون کو تکمل احصا کا نام دیا۔ یہ نیوٹن کے مماس کے معکوس طریقہ کے مطابق ہے۔

نیوٹن اور لبنیٹز دونوں نے کافی غیر انحصار نظریہ کو اپنایا جو کہ کافی مختلف تھا۔ حالانکہ، ان کے مطابق نظریہ اسی نتیجہ پر پہنچے جو کہ عملی طور پر یکساں تھے۔ لبنیٹز نے معین تکملہ کی علامت کا استعمال کیا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے اس نے صاف طور پر مخالف مشتق اور محدود تکملہ کے درمیان بنے رشتے کو خوش آمدید کہا۔

نتیجتاً، تکملہ احصا کا نظریہ اور بنیادی نظریہ اور اس کی سوچ اور تفرق احصا کے ساتھ اس کا بنیادی رشتہ سترھویں صدی کے آخر میں پی۔ ڈی۔ فرمیٹ (P. de Fermat)، آئی۔ نیوٹن (I. Newton) اور جی۔ لبنیٹز (G. Leibnitz) کے کام کے ساتھ فروغ پایا۔

حالانکہ انتہا کا تصور قابل سوچ تھا جو کہ انیسویں صدی میں اے۔ ایل۔ کوچے (A.L. Cauchy) کے کام میں فروغ پایا۔ آخر میں لی۔ سوفیس (Lie Sophie's) کے ذریعہ دیا گیا درج ذیل قول بیش قیمتی ہے۔

”یہ کہا جاسکتا ہے کہ تفرقی خارج قسمت اور تکملہ جو اپنے مبدا میں آرکی میڈیز (Archimedes) کی طرف واپس جاتے ہیں، سائنس میں کیلپر، ڈیس کارٹیس، کاویلیری، فریٹ اور ویلس کی کھوج میں تعارف کرایا۔ اس بات کا دریافت کرنا کہ تفرق اور تکمل معکوس عمل ہیں نیوٹن اور لبنیٹز سے تعلق رکھتی ہے۔“

