

पाठ 10. वृत्त

प्रश्नावली 10.1

Q1. खाली स्थान भरिए:

- (i) वृत्त का केन्द्र वृत्त के _____ में स्थित है (बहिर्भाग/अभ्यंतर)।
- (ii) एक बिन्दु, जिसकी वृत्त के केन्द्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के _____ स्थित होता है (बहिर्भाग/अभ्यंतर)।
- (iii) वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का _____ होता है।
- (iv) एक चाप _____ होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों।
- (v) वृत्तखंड एक चाप तथा _____ के बीच का भाग होता है।
- (vi) एक वृत्त, जिस तल पर स्थित है, उसे _____ भागों में विभाजित करता है।

उत्तर :

- (i) अभ्यंतर
- (ii) बहिर्भाग
- (iii) व्यास
- (iv) अर्धवृत्त
- (v) जीवा
- (vi) अनंत

Q2. लिखिए, सत्य या असत्य। अपने उत्तर के कारण दीजिए।

- (i) केन्द्र को वृत्त पर किसी बिन्दु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है।
- (ii) एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती हैं।
- (iii) यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बाँट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है।
- (iv) वृत्त की एक जीवा, जिसकी लम्बाई त्रिज्या से दो गुनी हो, वृत्त का व्यास है।
- (v) त्रिज्यखंड, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है।
- (vi) वृत्त एक समतल आकृति है।


उत्तर:

- (i) सत्य
- (ii) सत्य
- (iii) असत्य
- (iv) सत्य
- (v) असत्य
- (vi) सत्य

प्रश्नावली 10.2

Q1. याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएँ बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएँ उनके केन्द्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।

हल :



दिया है : O और O' वाले दो सर्वांगसम

वृत्त हैं जिनकी बराबर जीवाएँ $AB = PQ$ है ।

सिद्ध करना है :

$\angle AOB = \angle PO'Q$ है ।

प्रमाण : $\triangle AOB$ तथा $\triangle PO'Q$ में

$AO = PO'$ (सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है)

$BO = QO'$ (सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या)


$AB = PQ$ (दिया है)

SSS सर्वांगसमता नियम से

$\triangle AOB \cong \triangle PO'Q$

अतः $\angle AOB = \angle PO'Q$ (BY CPCT) **Proved**

Q2. सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएँ उनके केन्द्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, तो जीवाएँ बराबर होती हैं।



हल :

दिया है : O और O' वाले दो सर्वांगसम

वृत्त हैं जिनमें $\angle AOB = \angle PO'Q$ है ।

सिद्ध करना है :

$AB = PQ$ है ।

प्रमाण : $\triangle AOB$ तथा $\triangle PO'Q$ में

$AO = PO'$ (सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है)

$BO = QO'$ (सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या)

$\angle AOB = \angle PO'Q$ (दिया है)

SSS सर्वांगसमता नियम से


$\triangle AOB \cong \triangle PO'Q$

अतः $AB = PQ$ (BY CPCT) **Proved**

Exercise 10.3

Q1. वृत्तों के कई जोड़े (युग्म) खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिन्दु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिन्दुओं की अधिकतम संख्या क्या है?

Q2. मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए।



हल : रचना के पद :

- (i) दिया हुआ बिना केंद्र वाला एक खिंचा ।
- (ii) वृत्त पर तीन असंरेखी बिन्दुएँ A, B तथा C डाला और A को B से और B को C से मिलाया ।
- (iii) रेखाखंड AB और BC का लंब समद्विभाजक खिंचा जो एक दुसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं ।
- (iv) बिंदु O ही दिए गए वृत्त का अभीष्ट केंद्र है ।

Q3. यदि दो वृत्त परस्पर दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लम्ब समद्विभाजक पर स्थित हैं।

हल :

दिया है : O और O' वाले दो वृत्त एक

दुसरे को बिन्दुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती हैं ।

अतः उभयनिष्ठ जीवा AB है ।

दिया है : O और O' वाले दो वृत्त एक

दुसरे को बिन्दुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती हैं ।

अतः उभयनिष्ठ जीवा AB है ।

सिद्ध करना है : $AM = BM$ और $OM \perp AB$ है ।

प्रमाण : $\triangle OAO'$ तथा $\triangle OBO'$ में

$$OA = OB \text{ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)}$$

$$O'A = O'B \text{ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)}$$

$$OO' = OO' \text{ (उभयनिष्ठ)}$$

SSS सर्वांगसमता नियम से

$$\triangle OAO' \cong \triangle OBO'$$

$$\text{अतः } \angle AOO' = \angle BOO' \dots (1) \text{ By CPCT}$$

अब, $\triangle AOM$ तथा $\triangle BOM$ में

$$AO = BO \text{ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)}$$

$$OM = OM \text{ (उभयनिष्ठ)}$$

$$\angle AOM = \angle BOM \quad \text{समी० (1) से}$$

SAS सर्वांगसमता नियम से

$$\triangle AOM \cong \triangle BOM$$

$$\text{अतः } AM = BM$$

$$\text{और } \angle OMA = \angle OMB \dots (2)$$

} By CPCT

अब चूँकि AB एक सरल रेखा है ।

इसलिए, $\angle OMA + \angle OMB = 180^\circ$ (रैखिक युग्म)

या $\angle OMA + \angle OMA = 180^\circ$

या $2\angle OMA = 180^\circ$

या $\angle OMA = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$


अतः $AM = BM$ और $OM \perp AB$ है | **Proved**

Exercise – 10.4

Q1. 5 cm तथा 3 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केन्द्रों बीच की दूरी 4 cm है। उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

□
हल :

□



$AO = 5 \text{ cm}$

$AO' = 3 \text{ cm}$

$OO' = 4 \text{ cm}$

$AB = ?$

$$S = \frac{a + b + c}{2} = \frac{5 + 4 + 3}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$$

$\Delta OAO'$ का क्षेत्रफल (हेरॉन सूत्र से)

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{6(6-5)(6-4)(6-3)}$$

$$= \sqrt{6(1)(2)(3)}$$

$$= \sqrt{6 \times 6}$$

$$= 6 \text{ cm}^2$$

$$\Delta OAO' \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 4 \times AM$$

$$\text{या} \quad 6 \text{ cm}^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times AM$$

$$\text{या} \quad 2 AM = 6 \text{ cm}^2$$

$$\text{या} \quad AM = \frac{6}{2} \text{ cm}^2$$


$$\text{या} \quad AM = 3 \text{ cm}^2$$

$$\text{अतः } AB = 2 AM = 2 \times 3 \text{ cm}^2 = 6 \text{ cm}^2$$

अतः उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई 6 cm^2 है ।

Q2. यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ वृत्त के अन्दर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं।

हल :



दिया है : O केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं AB तथा CD हैं | जो एक दुसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं |

सिद्ध करना है : $AE = CE$ और $BE = DE$ है |

रचना : O से M तथा N को मिलाया |

प्रमाण : $OM \perp AB$ और $ON \perp CD$ है |

(जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है |)

$\triangle EOM$ तथा $\triangle EON$ में

$OM = ON$ (बराबर जीवाओं की केंद्र से दुरी)

$EO = EO$ (उभयनिष्ठ)

$\angle OME = \angle ONE$ (प्रत्येक 90°)

RHS सर्वांगसमता नियम से

$\triangle EOM \cong \triangle EON$

इसलिए, $EM = EN$ (1) By CPCT

जबकि $AB = CD$ (दिया है)

$$\text{या } \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CD$$

$$\text{या } AM = CN \text{ (2)}$$

$$\text{या } BM = DN \text{ (3)}$$

अब समीकरण (2) में से (1) घटाने पर

$$AM - EM = CN - EN$$

$$\text{या } AE = CE \text{ **Proved (i)}**}$$

अब समीकरण (3) में (1) जोड़ने पर

$$BM + EM = DN + EN$$


$$\text{या } BE = DE \text{ **Proved (ii)}**}$$

अतः $AE = CE$ और $BE = DE$ है ।

इसलिए जीवा के संगत अंतःखंड बराबर हैं ।

Q3. यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ वृत्त के अन्दर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिन्दु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है।

हल :



दिया है : O केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवायें

AB तथा CD वृत्त के अन्दर बिंदु E पर

प्रतिच्छेद करती हैं ।

रचना : E को केंद्र O से मिलाया ।

सिद्ध करना है : $\angle MEO = \angle NEO$

प्रमाण : $OM \perp AB$ और $ON \perp CD$ है ।

(जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है ।)

$\triangle EOM$ तथा $\triangle EON$ में

$OM = ON$ (बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी)

$EO = EO$ (उभयनिष्ठ)

$\angle OME = \angle ONE$ (प्रत्येक 90°)


RHS सर्वांगसमता नियम से

$\triangle EOM \cong \triangle EON$

अतः $\angle MEO = \angle NEO$ By CPCT Proved


Q4. यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों (एक ही केंद्र वाले वृत्त) को, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए $AB = CD$ है ।

हल :



दिया है : दो संकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र O है ।

एक रेखा वृत्त को A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करती हैं।



सिद्ध करना है : $AB = CD$

रचना : $OM \perp AD$ खिंचा।

प्रमाण : $OM \perp AD$ (रचना से)

इसलिए, $AM = DM$ (1)

(जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है)

इसीप्रकार, $BM = CM$ (2)


समीकरण (1) में से (2) घटाने पर

$$AM - BM = DM - CM$$

या $AB = CD$ **Proved**

Q5. एक पार्क में बने 5 m त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियाँ रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 m हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है?

हल :



वृत्त का केंद्र O और और माना कि वृत्त पर
रेशमा (R), सलमा (S) और मनदीप (M) है ।

$RS = 6\text{ m}$, $SM = 6\text{ m}$ और $RM = ?$

$OR = OS = 5\text{ cm}$ है ।

ΔROS में,

$a = 5\text{ cm}$, $b = 5\text{ cm}$ और $c = 6\text{ cm}$

$$\text{इसलिए, } S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5+5+6}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}$$

ΔROS का क्षेत्रफल (हेरॉन सूत्र से)

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{8(8-5)(8-5)(8-6)}$$

$$= \sqrt{8(3)(3)(2)}$$

$$= \sqrt{3 \times 3 \times 4 \times 4}$$

$$= 3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$$

अब, ΔROS का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

$$12 = \frac{1}{2} \times OS \times RN$$

$$12 = \frac{1}{2} \times 5 \times RN$$

$$RN = 12 \times \frac{2}{5}$$

$$RN = \frac{24}{5} = 4.8 \text{ m}$$

$$RM = 2 \times RN$$


$$RM = 2 \times 4.8$$

$$= 9.6 \text{ m}$$

अतः रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी 9.6 है।

Q6. 20 m त्रिज्या का एक गोल पार्क (वृत्ताकार) एक कालोनी में स्थित है। तीन लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल :



माना अंकुर की स्थिति A, सैयद की S और डेविड की D है ।

अतः फोन की डोरी की लंबाई $AS = SD = AD = x$ m है ।

वृत्त की त्रिज्या $AO = OS = OD = 20$ m है ।

रचना : $OM \perp SD$ खिंचा ।

चूँकि $\triangle ASD$ एक समबाहु है ।

$$\begin{aligned}\text{इसलिए } \triangle ASD \text{ का क्षेत्रफल} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 \text{ m}^2\end{aligned}$$

अब, चूँकि $OM \perp SD$ है ।

इसलिए, समकोण $\triangle DOM$ में, $OD = 20 \text{ m}$ $DM = \frac{x}{2} \text{ m}$

अतः पाइथागोरस प्रमेय से,

$$OD^2 = OM^2 + DM^2$$

$$\text{या } 20^2 = OM^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$\text{या } 400 = OM^2 + \frac{x^2}{4}$$

$$\text{या } OM^2 = 400 - \frac{x^2}{4}$$

$$\text{या } OM^2 = \frac{1600 - x^2}{4}$$

$$\text{या OM} = \sqrt{\frac{1600 - x^2}{4}}$$

$$\text{या OM} = \frac{\sqrt{1600 - x^2}}{2} \text{ m}$$

अब, $\triangle ASD$ का क्षेत्रफल = 3 ($\triangle SOD$ का क्षेत्रफल)

[क्योंकि $\text{ar}(\text{SOD}) = \text{ar}(\text{AOS}) = \text{ar}(\text{AOD})$ है]

$$\text{अतः } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = 3 \left(\frac{1}{2} \times SD \times OM \right)$$

$$\text{या } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = 3 \left(\frac{1}{2} \times x \times \frac{\sqrt{1600 - x^2}}{2} \right)$$

$$\text{या } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = \left(\frac{3}{4} \times x \sqrt{1600 - x^2} \right)$$

$$\text{या } \sqrt{3} x^2 = (3x \sqrt{1600 - x^2})$$

$$\text{या } x = (\sqrt{3} \sqrt{1600 - x^2}) \quad [\text{दोनों पक्षों से सरलीकरण करने पर}]$$

$$\text{या } x = \sqrt{3(1600 - x^2)}$$

$$\text{या } x^2 = 3(1600 - x^2) \quad [\text{दोनों पक्षों को वर्ग करने पर}]$$

$$\text{या } x^2 = 4800 - 3x^2$$

$$\text{या } x^2 + 3x^2 = 4800$$

$$\text{या } 4x^2 = 4800$$

$$\text{या } x^2 = \frac{4800}{4}$$

$$\text{या } x^2 = 1200$$

$$\text{या } x = \sqrt{1200}$$

$$\text{या } x = \sqrt{400 \times 3}$$


$$\text{या } x = 20\sqrt{3} \text{ m}$$

अतः डोरी की लंबाई $20\sqrt{3} \text{ m}$ है ।

Exercise 10.5

Q1. आकृति 10.36 में, केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि $\angle BOC = 30^\circ$ तथा $\angle AOB = 60^\circ$ है | यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, तो $\angle ADC$ ज्ञात कीजिए |

हल :



$$\angle AOC = 2 \angle ADC \text{ (प्रमेय 10.8 से)}$$

[एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है |]

$$\text{या } \angle AOB + \angle BOC = 2 \angle ADC$$

$$\text{या } 60^\circ + 30^\circ = 2 \angle ADC$$


$$\text{या } 2 \angle ADC = 90^\circ$$

$$\text{या } \angle ADC = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$

$$\text{अतः } \angle ADC = 45^\circ$$

Q2. किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है | जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए |

हल :



चाप AB त्रिज्याएँ OA तथा OB के बराबर है ।

इसलिए $\triangle AOB$ एक समबाहु त्रिभुज है ।

अतः $\angle AOB = 60^\circ$ (समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण)

अब, $\angle AOB = 2\angle APB$

(वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है)

या $60^\circ = 2\angle APB$

या $\angle APB = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$

अतः दीर्घ चाप में बना कोण 30° है ।

अब चूँकि APBQ एक चक्रीय चतुर्भुज है ।

इसलिए $\angle P + \angle Q = 180^\circ$

(चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग)

या $30^\circ + \angle Q = 180^\circ$


या $\angle Q = 180^\circ - 30^\circ$

या $\angle Q = 150^\circ$

अतः दीर्घ वृत्त में बना कोण 150° है ।

Q3. आकृति 10.37 में, $\angle PQR = 100^\circ$ है, जहाँ P, Q तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं । $\angle OPR$ ज्ञात कीजिए ।

हल :



दिया है - $\angle PQR = 100^\circ$ है ।

चूँकि (वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है)

इसलिए $\angle POR = 2 \angle PQR$

या $\angle POR = 2 \times 100^\circ$

या $\angle POR = 200^\circ$

अब प्रतिवर्ती $\angle POR = 360^\circ - 200^\circ$

या प्रतिवर्ती $\angle POR = 160^\circ$

ΔPOR में, $PO = RO$ (एक ही वृत्त की त्रिज्या)

इसलिए $\angle OPR = \angle ORP$ (1) (बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं)

अब, $\angle OPR + \angle ORP + \angle POR = 180^\circ$ (तीनों कोणों का योग)

या $\angle OPR + \angle OPR + 160^\circ = 180^\circ$ समी० (1) से

या $2 \angle OPR = 180^\circ - 160^\circ$


या $2 \angle OPR = 20^\circ$

या $\angle OPR = \frac{20^\circ}{2}$

या $\angle OPR = 10^\circ$ उत्तर

Q4. आकृति 10.38 में, $\angle ABC = 69^\circ$ और $\angle ACB = 31^\circ$ हो, तो $\angle BDC$ ज्ञात कीजिए ।

हल :



ΔABC में,

$\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$ (त्रिभुज के तीनों का योग)

या $69^\circ + 31^\circ + \angle BAC = 180^\circ$

या $100^\circ + \angle BAC = 180^\circ$

या $\angle BAC = 180^\circ - 100^\circ$


या $\angle BAC = 80^\circ$

अब चूँकि $\angle BAC = \angle BDC$

इसलिए, $\angle BDC = 80^\circ$

Q5. आकृति 10.39 में, एक वृत्त पर A, B, C और D चार बिंदु हैं | AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि $\angle BEC = 130^\circ$ तथा $\angle ECD = 20^\circ$ है | $\angle BAC$ ज्ञात कीजिए |

हल :



BED एक सरल रेखा है |

इसलिए, $\angle BEC + \angle CED = 180^\circ$ (रैखिक युग्म)

या $130^\circ + \angle CED = 180^\circ$

या $\angle CED = 180^\circ - 130^\circ$


या $\angle CED = 50^\circ$

अब $\angle BAC = \angle CED$ [क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं]

इसलिए $\angle BAC = 50^\circ$

Q6. ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिन्दु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $\angle DBC = 70^\circ$ और $\angle BAC = 30^\circ$ हो, तो $\angle BCD$ ज्ञात कीजिए। पुनः यदि $AB = BC$ हो, तो $\angle ECD$ ज्ञात कीजिए ।

हल :



दिया है कि $\angle DBC = 70^\circ$ और $\angle BAC = 30^\circ$ है ।

अब, $\angle BAC = \angle BDC$ [एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं]

इसलिए, $\angle BDC = 30^\circ$ (1)

अब DBCD में,

$\angle BDC = 30^\circ$, $\angle DBC = 70^\circ$ और $\angle BCD = ?$

अब $\angle BDC + \angle DBC + \angle BCD = 180^\circ$ [त्रिभुज के तीनों कोणों का योग]

या $30^\circ + 70^\circ + \angle BCD = 180^\circ$ समी० (1) से

या $100^\circ + \angle BCD = 180^\circ$

या $\angle BCD = 180^\circ - 100^\circ$

या $\angle BCD = 80^\circ$

अब, $AB = BC$ दिया है

इसलिए, $\angle BAC = \angle BCA$ (2) [बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं]

अब चूँकि $\angle BAC = 30^\circ$ है ।

इसलिए $\angle BCA = 30^\circ$ समी० (2) से

या $\angle ECB = 30^\circ$

चूँकि $\angle BCD = 80^\circ$ है ।

या $\angle ECB + \angle ECD = 80^\circ$


या $30^\circ + \angle ECD = 80^\circ$

या $\angle ECD = 80^\circ - 30^\circ = 50^\circ$

अतः $\angle ECD = 50^\circ$ और $\angle BCD = 80^\circ$ है ।

Q7. यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है।

हल :



दिया है : ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है

जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं ।

सिद्ध करना है : ABCD एक आयत है ।

प्रमाण : $\triangle AOB$ तथा $\triangle COD$ में

$$OA = OC \text{ (एक ही वृत्त कि त्रिज्यायें)}$$

$$OB = OD \text{ (एक ही वृत्त कि त्रिज्यायें)}$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (शिर्षाभिमुख कोण)}$$

SAS सर्वांगसमता नियम से

$$\triangle AOB \cong \triangle COD$$

अतः $AB = CD \dots(1)$ (By CPCT)

और $\angle BAO = \angle DCO$ एकांतर कोण

अतः $AB \parallel CD \dots(2)$

समी० (1) तथा (2) से

ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ।

अब BD विकर्ण वृत्त का व्यास है (दिया है)


इसलिए $\angle A = 90^\circ$ तथा $\angle C = 90^\circ$ है । [अर्धवृत्त में बना कोण 90° होता है]

अतः ABCD एक आयत है ।

(वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है)

Q8. यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएँ बराबर हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है।

हल :



दिया है : ABCD एक समलंब है जिसमें

$AB \parallel CD$ है और $AD = BC$ है ।

सिद्ध करना है :

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ।

प्रमाण : $\triangle ACD$ तथा $\triangle BDC$ में

$$AD = BC \text{ (दिया है)}$$

$$DC = DC \text{ (दिया है)}$$

$$\angle DAC = \angle CBD \text{ (एक ही वृत्त खंड में बने कोण)}$$

SAS सर्वांगसमता नियम से

$$\triangle ACD \cong \triangle BDC$$

$$\text{अतः } \angle D = \angle C \dots\dots (1) \text{ By CPCT}$$

अब चूँकि $AB \parallel CD$ दिया है


इसलिए, $\angle A + \angle D = 180^\circ$ (अतः आसन्न कोणों का योग)

या $\angle A + \angle C = 180^\circ$ समी० (1) से

अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है | **Proved**

Q9. दो वृत्त दो बिन्दुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को A, D और P, Q पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि $\angle ACP = \angle QCD$ है।

हल :



सिद्ध करना है : $\angle ACP = \angle QCD$

प्रमाण :

चाप AP बने कोण $\angle ABP$ तथा $\angle ACP$ हैं।

अतः $\angle ABP = \angle ACP$ (1) [एक ही वृत्त खंड में बने कोण]

अब, $\angle ABP = \angle QBD$ (2) [शिर्षाभिमुख कोण]

समीकरण (1) तथा (2) से

$$\angle ACP = \angle QBD \text{ (3)}$$


पुनः $\angle QCD = \angle QBD$ (4) [एक ही वृत्त खंड में बने कोण]

अतः समीकरण (3) तथा (4) से

$$\angle ACP = \angle QCD \text{ **Proved**}$$

Q10. यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएँ, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिन्दु तीसरी भुजा पर स्थित है।

हल :



दिया है : ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं

AB तथा AC को व्यास मानकर O तथा O' वाले

दो वृत्त खिंचा है | उभयनिष्ठ जीवा AD है |

सिद्ध करना है : बिंदु D BC पर स्थित है |

प्रमाण : AB O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है |

अतः $\angle ADB = 90^\circ$ (1) (अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है)

अब, AC O' वाले वृत्त का व्यास है ।

अतः $\angle ADC = 90^\circ$ (2) (अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है)

समीकरण (1) तथा (2) जोड़ने पर

$$\angle ADB + \angle ADC = 90^\circ + 90^\circ$$

या $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ [रैखिक युग्म]

अतः BDC एक सरल रेखा है जिसपर बिंदु D स्थित है | **Proved**

$\angle \Delta \cong$