

باب

6



5173CH06

بکھراؤ کی پیمائش (Measures of Dispersion)



کس طرح مجتمع کیا جاتا ہے۔ تاہم وہ قدر ڈیٹا میں موجود تغیر پذیری کا اظہار نہیں کرتی۔ اس باب میں آپ ان پیمائشوں کا مطالعہ کریں گے جو ڈیٹا کی تغیر پذیری کی مقدار کے تعین کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔

تین دوست رام، رحیم اور ماریہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ اپنی بات چیت کے دوران انہوں نے اپنی فیملی کی آمدنیوں کے بارے میں بات شروع کر دی۔ رام انہیں بتاتا ہے کہ اس کی فیملی میں چار ممبر ہیں اور ہر ممبر کی اوسط آمدنی 15,000 روپے ہے۔ رحیم کہتا ہے کہ اس کی فیملی میں 52 اوسط آمدنی یہی ہے حالانکہ ممبروں کی تعداد 6 ہے۔ ماریہ 52 بتاتی ہے کہ اس کی فیملی میں پانچ ممبر ہیں جن میں ایک کام نہیں

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- اوسطوں کے حدود سے واقف ہوں؛
- بکھراؤ کی پیمائش کی ضرورت کی قدر شناسی کر سکیں؛
- بکھراؤ کی مختلف پیمائشوں کا شمار کر سکیں؛
- پیمائشوں کا حساب اور ان کا موازنہ کر سکیں؛
- مطلق اور انسانی پیمائشوں کے درمیان امتیاز کر سکیں؛

1. تعارف

پچھلے باب میں، آپ نے مطالعہ کیا کہ دیٹا کو ایک نمائندہ قدر میں

قدروں کی ایک نمائندہ سائز بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لئے آپ قدروں کے پھیلاؤ کے بھی جاننے کی ضرورت ہوگی۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام کی فیملی میں آمدنیوں کے فرق نسبتاً کم ترین ہیں۔ رحیم کی فیملی میں یہ فرق زیادہ ہے اور ماریہ کی فیملی میں بہت ہی زیادہ۔ اس طرح صرف اوسط کی واقفیت ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دوسری قدر ہے جو قدروں میں تغیر کی مقدار ظاہر کرتی ہے تب آپ کی تقسیم کی فہم زیادہ بہتر ہوگی۔ مثال کے لیے فی کس آمدنی صرف اوسط آمدنی ظاہر کرتی ہے۔ انتشار کی پیمائش آپ کو آمدنی کی نامساوات بتا سکتی ہے اس سے آپ کو سماج کے مختلف طبقات کی نسبتی یا اضافی معیار زندگی کو سمجھنے میں بہتری پیدا ہوگی۔ بکھراؤ (Dispersion) تقسیم کی قدروں میں وہ حد ہے جو تقسیم کی اوسط سے متفرق ہوتی ہے۔

تغیر کی حد کی مقدار کے تعین کے لئے کچھ مخصوص پیمائش ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

- (i) وسعت (Range)
- (ii) کوارٹائل انحراف (Quartile Deviation)
- (iii) وسطی انحراف (Mean Deviation)
- (iv) معیاری انحراف (Standard Deviation)


ان پیمائشوں کو جو کہ عددی قدر دیتی ہیں، کے علاوہ بکھراؤ کا تخمینہ کرنے کے لیے گرافنی طریقہ بھی ہوتا ہے۔

کر رہا ہے۔ وہ بھی حساب لگاتی ہے کہ اس کی فیملی کی بھی اوسط آمدنی 15,000 روپے ہے۔ ان کو تھوڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماریہ کے والد بہت زیادہ تنخواہ پارہے ہیں۔ وہ اس کی تفصیلات میں گئے اور انہوں نے درج ذیل ڈیٹا اکٹھا کیا۔

فیملی کی آمدنیاں

نمبر شمار	رام	رحیم	ماریہ
1	12,000	7,000	0
2	14,000	10,000	7,000
3	16,000	14,000	8,000
4	18,000	17,000	10,000
5	-----	20,000	50,000
6	-----	22,000	-----
کل آمدنی	60,000	90,000	75,000
اوسط آمدنی	15,000	15,000	15,000

کیا آپ غور کرتے ہیں کہ اگرچہ اوسط ایک ہے پھر بھی انفرادی آمدنیوں میں خاصا فرق ہے؟
یہ بالکل واضح ہے کہ اوسط، تقسیم کا صرف ایک پہلو یعنی



بعض حدوں کے باوجود، رینج کو اس کے سہل ہونے کے سبب اکثر سمجھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے لئے ہم اپنے ٹی وی اسکرین پر تقریباً روز مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت دیکھتے ہیں اور ان میں بدلتے ہوئے درجہ حرارت کے بارے میں اندازہ قائم کرتے ہیں۔

غیر محدود تقسیم وہ ہے جس میں سب سے چلی کلاس کی نہ تو چلی حد نہ ہی سب سے اونچی کلاس کی اوپری حد یا دونوں کی صراحت نہیں ہوتی۔

سرگرمی

- اخبار سے تقریباً 52 ہفتے کے اونچے رینچے 10 کمپنیوں کے ڈیٹا جمع کیجئے۔ شیئر قیمتوں کی رینج شمار کیجئے۔ کون سے اسٹاک پر زیادہ تلون اور کون سے پر زیادہ مستحکم ہے۔

کوارٹائل انحراف

تقسیم میں انتہائی طور پر اونچی یا نیچی قدر کی موجودگی بھی بکھراؤ کی پیمائش کے طور پر رینج کی افادیت کو کم کر سکتی ہے۔ اس طرح آپ کو ایک ایسی پیمائش کی ضرورت ہوگی جو منفصل (Outlier) کے ذریعہ ضرورت سے زیادہ یا بے جا طور پر نہ متاثر ہو۔

ایسی صورتحال میں اگر پورے ڈیٹا کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تب ہر ایک 25% قدروں پر مشتمل ہوگا۔ ہم کوارٹائل اور وسطانیہ کی قدریں حاصل کرتے ہیں۔ (آپ ان کے بارے میں پہلے ہی باب 5 میں پڑھ چکے ہیں)۔

رینج اور کوارٹائل انحراف بکھراؤ کی پیمائش اس پھیلاؤ کو شمار کرنے کے ذریعہ جو کہ قدروں میں واقع ہوتی ہے، کرتے ہیں، وسط انحراف اور معیاری انحراف ان قدروں کی حد کا شمار رکھتے ہیں جو اوسط مختلف ہوتی ہے۔

2. قدروں کے پھیلاؤ پر مبنی پیمائش

رینج (R) تقسیم میں سب سے بڑی قدر (L) اور سب سے چھوٹی قدر (S) کے درمیان فرق ہے۔
اس طرح، $R = L - S$

سرگرمیاں

درج ذیل قدروں پر ایک نظر ڈالیں:

20 30 40 50 200

- رینج کا شمار کیجئے
- اگر ڈیٹا سیٹ میں قدر 200 موجود نہیں ہے تب رینج کیا ہوگی؟
- اگر 50 کو 150 کے عوض رکھا جاتا ہے تب رینج کیا ہوگی؟

رینج توضیحات

منتهائی قدروں سے رینج ضرورت سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ سبھی قدروں پر نہیں مبنی ہوتی، جب تک کم ترین اور بیش ترین قدریں تبدیل نہیں ہوتیں۔ دیگر قدریں کسی بھی تبدیلی رینج پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کا شمار غیر محدود (Open ended) تواتری تقسیم کے لیے نہیں کیا جاسکتا۔

رینج کی سب سے اونچی قدر اونچے بکھراؤ کی دلالت کرتی ہے اور رینج کی سب سے نیچی قدر کم بکھراؤ کی دلالت کرتی ہے۔

اس طرح، Q_3 یہ $\frac{3(n+1)}{4}$ ویں قدر کی سائز ہے
یعنی 9 ویں قدر جو کہ 51 ہے۔

لہذا $Q_3 = 51$

$$Q.D = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{51 - 29}{2} = 11$$

کیا آپ غور کرتے ہیں کہ $Q.D$ وسطانیہ سے کوارٹائل کا
اوسط فرق ہے۔

سرگرمی
• وسطانیہ معلوم کیجیے کیا درج بالا بیان صحیح ہے؟
تصدیق کیجیے

مثال 2

40 طلباء کی کلاس کے ذریعہ حاصل کیے گئے مارکس کی درج ذیل
کی تقسیم کے لیے ریٹھ اور Q_1 کا شمار کیجیے۔
جدول 6.1

طلباء کی تعداد	کلاس وقفے
(f)	C1
5	0-10
8	10-20
16	20-40
7	40-60
4	60-90
40	

ریٹھ محض اونچی کلاس کی اوپری اور نچلی کلاس کی حد کے درمیان
فرق ہے۔ لہذا ریٹھ $Q.P - 90 - 0 = 90$ (کوارٹائل انحراف)

اوپری اور نچلے کوارٹائل (علی الترتیب Q_3 اور Q_1) کا
استعمال بین کوارٹائل ریٹھ کا شمار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جو کہ
 $Q_3 - Q_1$ ہے۔

بین کوارٹائل ریٹھ تقسیم میں قدروں کی وسط 50% پڑتی ہے
اور اس لیے منتہائی قدروں کا اثر نہیں پڑتا۔ بین کوارٹائل ریٹھ کے
نصف کو کوارٹائل کل انحراف کہا جاتا ہے۔

$$Q.D = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$Q.D$ کو اس لیے نصف بین کوارٹائل کی ریٹھ کہا جاتا ہے۔
غیر گروپ بند ڈیٹا کے لیے ریٹھ اور $Q.D$ کا شمار کیجیے۔

مثال 1

درج ذیل مشاہدات کا ریٹھ اور $Q.D$ شمار کیجیے

20, 25, 29, 30, 35, 39, 41,

48, 51, 60, 70

واضح طور پر ریٹھ ہے $70 - 20 = 50$

$Q.D$ کے لئے ہمیں Q_3 اور Q_1 کی قدروں کے شمار کی ضرورت ہے۔

$$Q_1 = \frac{n+1}{4} \text{ ویں قدر کی سائز } Q_1 \text{ ہے}$$

11n ہونے سے

$Q_1 n$ تیسری قدر کی سائز ہے

چونکہ قدریں پہلے ہی صعودی ترتیب میں مرتب ہوتی ہیں،
یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ Q_1 یہ تیسری قدر 29 ہے (اگر یہ قدریں مرتب
نہیں ہیں تو پھر آگے کیا کریں گے؟)

$$Q_3 = L + \frac{\frac{3n}{4} - c.f}{f} \times i$$

$$Q_3 = 40 + \frac{30 - 29}{7} \times 20$$

$$Q_3 = 42.87$$

$$Q.D = \frac{42.87 - 16.25}{2} = 13.31$$

اگر پورے گروپ کو دو مساوی نصف میں تقسیم کیا جاتا ہے

th اور مجدد/ امتیازی انفرادی ($\frac{n+1}{4}$)th ویں قدر کی سائز Q_1 ہے۔
لیکن مسلسل تقسیم میں یہ ($\frac{n}{4}$)th قدر کی سائز ہے اسی طرح
 Q_3 اور وسطانیہ کے لیے بھی n کا استعمال (n+1) کی جگہ
پر کیا جاتا ہے۔

اگر پورے گروپ کو دو مساوی نصف میں تقسیم کیا جاتا ہے
اور ہر نصف کے لیے وسطانیہ کا شمار کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس
بہت اچھے طلباء کا وسطانیہ اور کمزور طلباء کا وسطانیہ ہوگا۔ یہ وسطانیہ
کسی اوسط 13.31.5 کے ذریعہ پورے گروپ کے وسطانیہ
سے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح مان لیں کہ آپ کے پاس کسی شہر
کے لوگوں کی آمدنیوں کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے تب بھی
لوگوں کی وسطانیہ آمدنی کا شمار کیا جاسکتا ہے۔ اگر سبھی لوگوں کو
امیر اور غریب کے دو مساوی گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تب
دونوں گروپوں کے وسطانیوں کا شمار کیا جاسکتا ہے کوارٹائل
انحراف میں آپ کو پورے گروپ کے وسطانیہ سے امیر سے
متعلق گروپ اور غریب سے متعلق گروپ کے وسطانیوں کے
درمیان اوسط فرق بتائے گا۔

کے لیے پہلے مجموعی تو اترات درج ذیل کے مطابق شمار کیجئے۔

کلاس وقفے	تو اترات	مجموعی تو اترات
C1	f	c.f
0-10	5	05
10-20	8	13
20-40	16	29
40-60	7	36
60-90	4	40
n = 40		

مسلسل سیریز میں ($\frac{n}{4}$)th قدر کی سائز Q_1 ہے۔ اس
طرح یہ 10 ویں قدر کی سائز ہے۔ 10 ویں قدر پر مشتمل کلاس
20-10 ہے لہذا Q_1 کلاس 10-20 میں واقع ہے۔ اب
 Q_1 کی بالکل درست قدر کا شمار کیجئے، درج ذیل فارمولے کا
استعمال کیا جاتا ہے۔

$$Q_1 = L + \frac{\frac{n}{4} - c.f}{f} \times i$$

یہاں $L = 10$ (متعلقہ کوارٹائل کلاس کی چلی حد ہے
 $C.f. = 5$ (کوارٹائل کلاس کی پیش رو کلاس کے لیے کی قدر)
 $i = 10$ (کوارٹائل کلاس کا وقفہ)
 $f = 8$ (کوارٹائل کلاس کا تو اتر)

اس طرح

$$Q_1 = 10 + \frac{10 - 5}{8} \times 10 = 16.25$$

اسی طرح Q_3 ($\frac{3n}{4}$)th قدر کی سائز Q_3 ہے۔

قدر یعنی 30 ویں قدر جو کلاس 60-40 کلاس میں واقع
ہیں۔ اب Q_3 کے لیے فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے
اسے درج ذیل طور پر شمار کیا جاسکتا ہے۔

کیا آپ شمار کی گئی قدروں سے تغیر کی مقدار پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔
وسط انحراف، انحرافات کی علامتوں کو نظر انداز کرنے کے
ذریعہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی سبھی انحرافات
مثبت پر غور کرتا ہے۔ معیاری انحراف کے لئے، انحرافات کو پہلے
مربع کیا جاتا ہے اور اوسط نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد اوسط کا
جذر مربع (Square root) دریافت کیا جاتا ہے اب ہم انہیں
الگ الگ بیان کریں گے۔

وسط انحراف

فرض کیجیے پانچ شہروں A, B, C, D اور E کے طلباء کے لیے ایک
کالج قائم کرنے کی تجویز رکھی گئی اور جو کہ سڑک کے ساتھ
واقع۔ شہر سے دیگر شہروں کی دوری کلومیٹر میں اور ان شہروں کے
طلباء کی تعداد درج ذیل ہے۔

شہر	شہر A سے دوری	طلباء کی تعداد
A	0	90
B	2	150
C	6	100
D	14	200
E	18	80
		620

اب اگر کالج شہر A میں واقع ہے۔ کالج پہنچنے کے لیے
ہر ایک کو 2 کلومیٹر سفر کرنا ہوگا۔ (کل 300 کلومیٹر)۔ مقصد یہ
ہے کہ ایسے وقوع کو دریافت کیا جائے کہ طلباء کے ذریعہ سفر کی
جانے والی اوسط دوری کم ترین ہو۔ (چونکہ آپ مشاہدہ کر سکتے

کو ارنائل انحراف کو عام طور پر غیر مقررہ تقسیم کے لئے شمار کیا
جاتا ہے۔ اور یہ منہائی قدروں کے ذریعہ بیجا متاثر نہیں ہوتا۔

3. اوسط سے بکھراؤ کی پیمائش

یاد کریں کہ بکھراؤ کی تعریف ان قدروں کی حد کے طور پر کی گئی تھی
جو ان کی اوسط سے متفرق ہوتی ہے۔ رینج اور کو ارنائل انحراف یہ
شمار کرنے کی سعی نہیں کرتے کہ انکی اوسط سے قدریں کتنی متفرق
ہیں۔ تاہم قدروں کے پھیلاؤ کو شمار کرنے کے ذریعے یہ انتشار
کے بارے میں اچھا تصور عطا کرتی ہیں۔ دو پیمائشیں جو قدروں
کے ان کے اوسط سے انحراف پر مبنی ہوتی ہیں وہ وسط انحراف
اور معیاری انحراف ہیں۔

چونکہ اوسط ایک مرکزی قدر ہے، بعض انحرافات مثبت
ہوتے ہیں اور بعض منفی۔

اگر انہیں ایسے ہی شامل کر لیا جائے جیسے کہ یہ ہیں تب جمع
سے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ درحقیقت حسابی وسط سے انحرافات کی
جمع ہمیشہ صفر ہوتی ہے۔ قدروں کے دو سیٹ پر ایک نظر ڈالیں۔

سیٹ A:	5	9	16
سیٹ B:	1	9	20

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ B میں قدریں اوسط سے
زیادہ دور ہیں اور اس بنا پر سیٹ A میں قدروں کی نسبت زیادہ
منتشر ہوں گی۔ حسابی وسط سے انحرافات کا شمار کیجیے۔ اور ان کا
خلاصہ کیجیے۔

آپ کیا غور کرتے ہیں؟ اسے وسطانیہ کے ساتھ دہرائیے

$$M.D. = \frac{\sum |d|}{n} \text{ یعنی}$$

مثال 3

درج ذیل قدروں 9 اور 8، 7، 4، 2 کے اوسط انحراف کا شمار کیجئے۔

$$A.M. = \frac{\sum X}{n} = 6$$

d	X
4	2
2	4
1	7
2	8
3	9
12	

$$M.D.(\bar{x}) = \frac{12}{5} = 2.4$$

غیر گروپ بند ڈیٹا کے لیے وسطانیہ سے وسط انحراف
راست طریقہ

مثال 3 میں قدروں کا استعمال کرتے ہوئے وسطانیہ سے وسط
انحراف (M.P.) کا شمار درج ذیل طور پر کیا جاسکتا ہے:

- وسطانیہ کا شمار کیجئے جو کہ 6 ہے۔
- وسطانیہ سے مطلق انحرافات شمار کیجئے۔ انہیں $|d|$ کے طور پر
ظاہر کیجئے۔

(iii) ان مطلق انحرافات کی اوسط دریافت کیجئے۔ یہ وسط انحراف
ہے۔

ہیں کہ طلباء کو اوسطاً زیادہ سفر کرنا ہوگا اگر کالج شہر A یا E میں واقع
ہو جب کہ دوسری طرف اگر یہ کہیں وسط میں ہو تب اسے ممکن ہے
کم سفر کرنا پڑے۔ وسط انحراف طلباء کے ذریعے طے کی گئی اوسط
دوری کا شمار کرنے کے لیے بہتر شماریاتی طریقہ ہے۔ جو کہ بلاشبہ
قدروں کا ان کی اوسط سے فرق کا حسابی اوسط ہوگا۔

سرگرمیاں

- اگر کالج شہر A، شہر E میں واقع ہو اور اگر یہ A اور E
کے درمیان بالکل آدھے راستے پر واقع ہو تو طلباء کے
ذریعہ سفر میں طے کی گئی کل دوری شمار کیجئے۔
- فیصلہ کیجئے کہ آپ کے خیال میں کالج کہاں قائم کیا جانا
چاہئے اگر ہر قصبے میں صرف ایک طالب علم ہو تو کیا
آپ کے جواب میں تبدیلی آتی ہے؟

غیر گروپ بند ڈیٹا کے لیے حسابی اوسط سے وسط انحراف
(Mean Deviation) کا شمار کیجئے۔

راست طریقہ

مرحلے

- قدروں کے حساب اوسط کا شمار کیا جاتا ہے۔
- ہر قدر اور حسابی اوسط (A.M.) کے درمیان فرق کو شمار کیا
جاتا ہے۔
- (iii) ان فرق کے حساب وسط (انحرافات کہا جاتا ہے) وسط
انحراف ہے۔

مثال 5

(iii) ہر $|d|$ قدر کو اس کے مطابق تواتر کے ساتھ ضرب کریں تاکہ $|d|$ قدریں حاصل کر سکیں۔ $\sum f|d|$ حاصل کرنے کے لیے مختصر کریں۔

(iv) درج ذیل فارمولے کا اطلاق کریں۔

$$M.D. (\bar{x}) = \frac{\sum f |d|}{\sum f}$$

جدول 6.2 میں تقسیم کے وسط انحراف کو درج ذیل طور پر شمار کیا جاسکتا ہے۔

مثال 6

f d	d	m.p.	f	C.I
127.5	25.5	15	5	10-20
124.0	15.5	25	8	20-30
8.0	0.5	40	16	30-50
156.0	19.5	60	8	50-70
103.5	34.5	75	3	70-80
519.0			40	

$$M.D. (\bar{x}) = \frac{\sum f |d|}{\sum f} = \frac{519}{40} = 12.975$$

وسطانیہ سے وسط انحراف

جدول 6.3

تواترات	کلاس وقفے
5	20-30
10	30-40
20	40-60

X	وسطانیہ - d=IX
2	5
4	3
7	0
8	1
9	2
	11

وسطانیہ سے اس طرح M.D (وسطانیہ انحراف) ہے۔

$$M.D. (\text{وسطانیہ}) = \frac{\sum |d|}{n} = \frac{11}{5} = 2.2$$

مسلل تقسیم کے لیے وسط سے وسط انحراف

جدول 6.2

کمپنیوں کے منافع	کمپنیوں کی تعداد
کلاس وقفے	تواترات
10-20	5
20-30	8
30-50	16
50-70	8
70-80	3
	40

مرحلے

(i) تقسیم کا وسط شمار کیجیے۔

(ii) وسط سے کلاس کے وسطی نقاط کے مطلق انحرافات کا $|d|$

شمار کیجیے۔

شمار کیا جاتا ہے اس کے بعد وسط سے قدروں کے انحرافات کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان انحرافات کو تب مربع بنایا جاتا ہے۔ ان مربع انحرافات کی وسط تغیری ہے تغیر کا مثبت جذر المربع معیاری انحراف ہے۔
(نوٹ کیجیے کہ معیاری انحراف کا شمار صرف وسط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے)

غیر گروپ بند ڈیٹا کے معیاری انحراف کا شمار

انفرادی قدروں کے لیے معیاری انحراف کے شمار کے لیے چار متبادل طریقے دستیاب ہیں۔ یہ سبھی طریقے معیاری انحراف کی وہی قدر دیتے ہیں۔ یہ ہیں:

(i) حقیقی وسط طریقہ

(ii) مفروضہ وسط طریقہ

(iii) راست طریقہ

(iv) زینہ دار انحراف طریقہ

حقیقی وسط کے بجائے دیگر قدر سے انحرافات کی جمع صفر کے مساوی نہیں ہے۔

حقیقی وسط طریقہ

بالفرض آپ کو درج ذیل قدروں کے معیاری انحراف کا شمار کرنا ہے۔

5, 10, 25, 30, 50

شمار کرنے کا پہلا مرحلہ

$$\bar{X} = \frac{5+10+25+30+50}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

20	40-60
9	60-80
6	80-90
50	

وسطانیہ سے وسط انحراف شمار کرنے کا طریقہ وہی ہے وسط سے M.D کے معاملے میں ہے سوائے ان انحرافات کے جو وسطانیہ سے لیے جاتے ہیں جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے۔

مثال 7

f	d	m.p.	f	C.I
125	25	25	5	20-30
150	15	35	10	30-40
0	0	50	20	40-60
180	20	70	9	60-80
210	35	85	6	80-90
665			50	

$$M.D. (\text{وسطانیہ}) = \frac{\sum f |d|}{\sum f} = \frac{665}{50} = 13.3$$

وسط انحراف: توضیحات

وسط انحراف سبھی قدروں پر مبنی ہے۔ ایک قدر میں بھی تبدیلی اس پر اثر کرے گی۔ یہ کم ترین (اقل) ہے جب وسطانیہ سے شمار کیا جاتا ہے یعنی یہ اعظم ہوگا اگر وسط سے شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ انحرافات کی علامتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور غیر مقررہ تقسیم کے لئے شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

معیاری انحراف (Standard Deviation)

درمیانہ (Mean) سے مربعی انحراف کے درمیانہ کا مثبت جذر المربع معیاری انحراف ہوتا ہے۔ لہذا اگر پانچ قدریں

مثال 8

625	+25	50
1275	-5	

معیاری انحراف کے لیے فارمولا

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n} - \left(\frac{\sum d}{n}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1275}{5} - \left(\frac{-5}{5}\right)^2} = \sqrt{254} = 15.937$$

حقیقی اوسط کے سوا قدر سے لی گئی انحراف کی جمع صفر کے مساوی نہیں ہوگی۔ معیاری انحراف مستقلہ (constant) جس سے انحراف کا شمار کیا جاتا ہے، اس کے ذریعہ متاثر نہیں ہوتا۔ مستقلہ قدر معیاری انحراف فارمولے میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح معیاری انحراف مبدا (origin) سے آزاد ہوتا ہے۔

راست طریقہ

معیاری انحراف کو سیدھے طور پر قدروں سے بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ یعنی مشاہدات لیے بغیر، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔

مثال 10

X^2	x
25	5
100	10
625	25
900	30
2500	50
4150	120

یہ صفر سے انحرافات لینے کی یہ مقدار ہے۔

d^2	$d(X - \bar{X})$	x
361	-19	5
196	-14	10
1	+1	25
36	+6	30
676	+26	50
1270	0	

درج ذیل فارمولے کا استعمال کیا جاتا ہے۔

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}}$$

$$\sigma = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1270}{5}} = \sqrt{254} = 15.937$$

اس قدر پر کیا آپ غور کرتے ہیں جس سے انحرافات کا شمار

درج بالا مثال میں کیا گیا ہے؟

کیا یہ حقیقی وسط ہے؟

مفروضہ وسط طریقہ

اسی قدر کے لیے انحرافات کا شمار کسی اختیاری قدر $A\bar{X}$

جیسے $d = x - A\bar{X}$ سے کیا جاسکتا ہے۔ $A\bar{X} = 25$ لیتے

ہو۔ معیاری انحراف کا شمار نیچے دکھایا گیا ہے۔

مثال 9

d^2	$d(X - A\bar{X})$	x
400	-20	5
225	-15	10
0	0	25
25	+5	30

درج ذیل فارمولے کا استعمال کیا جاتا ہے۔

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} = (\bar{x})^2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{4150}{5} - (24)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{254} = 15.937$$

زینہ وار انحراف طریقہ

اگر قدریں مشترک جزو ضربی کے ذریعے قابل تقسیم ہوں، تب انہیں اس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اور معیاری انحراف کا شمار حاصل قدروں سے درج ذیل طور پر کیا جاسکتا ہے۔

مثال 11

چونکہ جزو ضربی 5 کے ذریعے سبھی پانچ قدریں قابل تقسیم ہیں، اس لیے ہم تقسیم کرتے ہیں اور درج ذیل قدریں حاصل کرتے ہیں۔

d^2	$d(X' - \bar{X}')$	x'	x
14.44	-3.8	1	5
7.84	-2.8	2	10
0.04	+0.2	5	25
1.44	+1.2	6	30
27.04	+5.2	10	50
50.80	0		

(شمار میں مراحل ویسے ہی ہیں جیسا کہ حقیقی وسط طریقے میں ہے)

$$x = \frac{x}{c}$$

جہاں C = مشترکہ جزو صرف شمار کرنے کا

پہلا مرحلہ

$$\bar{X}' = \frac{1+2+5+6+10}{5} = \frac{24}{5} = 4.8$$

درج ذیل فارمولے کا استعمال معیاری انحراف کا شمار

کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} \times c$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{50.80}{5}} \times 5$$

$$\sigma = \sqrt{10.16} \times 5$$

$$\sigma = 15.937$$

متبادل طور پر، جزو ضربی کے ذریعہ قدروں کو تقسیم کرنے کے بجائے انحرافات کو جزو ضربی کے ذریعے تقسیم کیا جاسکتا ہے معیاری انحراف کا شمار درج ذیل طور پر کیا جاسکتا ہے۔

مثال 12

d^2	$d(X' - \bar{X}')$	d	x
16	-4	-20	5
9	-3	-15	10
0	0	0	25
1	+1	+5	30
25	+5	+25	50
51	-1		

انحرافات کا شمار ایک اختیاری قدر 25 سے کیا جاتا ہے۔ 5 کے مشترکہ جزو ضربی کا استعمال انحرافات کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

$$\sigma = \sqrt{\sum d'^2 - \left\{ \sum d' \right\}^2} \times c$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{51}{5} - \left(\frac{-1}{2} \right)^2} \times 5$$

$$\sigma = \sqrt{10.16} \times 5 = 15.937$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma fm}{\Sigma f} = \frac{1620}{40} = 40.5$$

2. وسط سے وسطی قدروں کے انحرافات کا شمار کیجیے۔

$$d = m - \bar{x} \text{ (col. 5)}$$

3. Fd قدریں (کالم 6) حاصل کرنے کے کیجیے انحرافات کو

ان کے مطابق توازرات کے ساتھ ضرب دیں۔ (نوٹ کریں کہ

$$\Sigma fd = 0$$

4. d قدروں (کالم 7) کے ساتھ 'fd²' قدروں کو ضرب

دینے کے ذریعہ 'fd' قدروں کو شمار کیجیے۔ ان دونوں کی جمع

کر کے Σfd^2 حاصل کیجیے۔

5. درج ذیل فارمولے کا اطلاق کریں۔

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{n}} = \sqrt{\frac{11790}{40}} = 17.168$$

مفروضہ وسط طریقہ

مثال 13 میں قدروں کے لیے معیاری انحراف کا شمار مفروضہ

انحرافات (فرض کرو 40) لینے پر کیا جاسکتا ہے۔

مثال 14

1	2	3	4	5	6
CI	f	m	d	fd	fd ²
10-20	5	15	-25	-125	3125
20-30	8	25	-15	-120	1800
30-50	16	40	0	0	0
50-70	8	60	+20	160	3200
70-80	3	75	+35	105	3675
	40			+20	11800

درج ذیل مرحلے مطلوبہ ہیں

1. کلاس کے وسطی نقاط کا شمار کیجیے (کالم 3)

معیاری انحراف پیمانے سے آزاد نہیں ہے۔ اس طرح، اگر اقدار یا انحرافات کو ایک عام عنصر کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے تو، عام عنصر کی قدر کو معیاری انحراف کی قدر حاصل کرنے کے لیے فارمولے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

مسلسل توانتری تقسیم میں معیاری انحراف

غیر گروپ بند ڈیٹا کی طرح معیاری انحراف (S.D) کا شمار

درج ذیل طریقوں میں کسی کے ذریعہ گروپ بند ڈیٹا کے لیے

کیا جاسکتا ہے۔

(i) حقیقی طریقہ وسط

(ii) مفروضہ طریقہ وسط

(iii) مرحلہ وار طریقہ انحراف

حقیقی طریقہ وسط

جدول 6.2 میں قدروں کے لیے، معیاری انحراف کا شمار درج

ذیل طور پر کیا جاسکتا ہے۔

مثال 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CI	f	m	fm	d	fd	fd ²
10-20	5	15	75	-25.5	-127.5	3251.25
20-30	8	25	200	-15.5	-124.0	1922.00
30-50	16	40	640	-0.5	-8.0	4.00
50-70	8	60	480	+19.5	+156.0	3042.00
70-80	3	75	225	+34.5	+103.5	3570.75
	40		1620		0	11790.00

درج ذیل مرحلے مطلوبہ ہیں

1. تقسیم کی وسط شمار کیجیے

مثال 15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CI	f	m	d	d'	fd'	fd ²
10-20	5	15	-25	-5	-25	125
20-30	8	25	-15	-3	-24	72
30-50	16	40	0	0	0	0
50-70	8	60	+20	+4	+32	128
70-80	3	75	+35	+7	+21	147
	40				+4	472

ضروری مرحلے

1. کلاس کے وسطی نقاط (کالم 3) اور اختیاری طور پر چنی ہوئی قدر سے انحرافات کا شمار کریں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ مفروضہ طریقہ وسط میں ہے۔ اس مثال میں انحرافات قدر 40 سے لیے گئے ہیں (کالم 4)
2. 'C' کے طور پر ظاہر کیے گئے مشترک جزو ضربی کے ذریعہ انحرافات کو تقسیم کریں۔ درج بالا مثال میں $C=5$ اس طرح جو قدریں حاصل کی جاتی ہیں وہ 'd' قدریں ہیں (کالم 5)
3. 'd' قدروں کو اس کے نظیری (Corresponding) 'f' قدروں (کالم 2) کے ساتھ ضرب کریں۔ اس کی 'fd' قدریں (کالم 6) سے حاصل کریں۔
4. 'fd²' قدریں (کالم 7) حاصل کرنے کے لئے 'd' قدروں کے ساتھ 'fd' قدروں کو ضرب کریں۔
5. کالم 6 اور کالم 7 میں دی گئی قدروں کی جمع 'Σfd' اور 'Σfd²' قدروں کو حاصل کرنے کے لئے کریں۔
6. درج ذیل فارمولے کا اطلاق کریں۔

2. کسی مفروضہ وسط سے وسطی نقاط کا انحراف شمار کیجیے

$$d = m - A\bar{x} \quad (\text{کالم 4}) \quad \text{مفروضہ وسط} = 40$$

3. 'fd' قدریں (کالم 5) حاصل کرنے کے لئے مطابق

تواترات کے ساتھ 'd' کی قدروں کو ضرب دیں۔ (نوٹ

کریں کہ اس کالم کی کل جمع صفر نہیں ہے کیونکہ انحرافات

مفروضہ اوسط سے لئے گئے ہیں)

4. 'd' قدروں (کالم 4) کے ساتھ کالم 5 میں 'fd' قدروں کو

ضرب دیں تاکہ 'fd²' قدریں (کالم 6) حاصل کر سکیں

Σfd² دریافت کریں۔

$$5. \text{ دریافت کریں } \frac{\Sigma fd^2}{n} \text{ اور } \left(\frac{\Sigma fd}{n} \right)^2$$

معیاری انحراف کا شمار درج ذیل ضابطہ (Formula) کے

ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{n} - \left(\frac{\Sigma fd}{n} \right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{11800}{40} - \left(\frac{20}{40} \right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{29475} = 17.168$$

زینہ واریا مرحلہ وار انحراف طریقہ

اگر انحرافات کی قدریں کسی مشترک جزو ضربی سے قابل تقسیم ہوں،

تب زینہ واریا مرحلہ وار انحراف طریقہ سے شمار آسان ہو جاتا ہے

جیسا کہ درج ذیل مثال میں دکھایا گیا ہے۔

ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی یومیہ فروخت دکھائی گئی ہے۔ سیٹ A کے لئے ریٹج 500 ہے جب کہ سیٹ B کے لیے یہ 30,000 ہے۔ سیٹ B میں ریٹج کی قدر کہیں زیادہ ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروخت میں تغیر ڈپارٹمنٹل اسٹور کے لیے بہت زیادہ ہے؟ یہ آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ سیٹ A میں سب سے اونچی قدر سب سے چھوٹی قدر سے دوگنی ہے جب کہ سیٹ B کے لیے یہ صرف 30% زیادہ ہے اس طرح مطلق پیمائش تغیر کی حد کے بارے میں گمراہ کن تصور پیش کر سکتی ہیں خاص طور پر اس وقت جب اوسطیں نمایاں طور پر متفرق ہوں۔

مطلق پیمائشوں کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ یہ اکائیوں میں جواب دیتی ہیں جس میں اصل قدریں ظاہر کی جاتی ہیں تب انتشار بھی کلومیٹر میں ہوگا۔ تاہم اگر یہی قدریں میٹروں میں ظاہر کی جاتی ہیں تب مطلق پیمائش کا جواب میٹروں میں ہوگا اور انتشار کی قدر 1000 گنا ظاہر ہوگی۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لئے انتشار کی اضافی پیمائش استعمال کی جاسکتی ہیں۔ ہر مطلق پیمائش کا اضافی مثیل (Counterpart) ہوتا ہے اس طرح ریٹج کے لیے ضریب (Coefficient) ہے جو درج ذیل طور پر شمار کیا جاسکتا ہے:

$$\frac{L - S}{L + S} \text{ ریٹج کا ضریب}$$

یہاں L = سب سے بڑی قدر۔

S = سب سے چھوٹی قدر

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd'^2}{\sum f} - \left(\frac{\sum fd'}{\sum f}\right)^2} \times c$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{472}{40} - \left(\frac{4}{20}\right)^2} \times 5$$

$$\sigma = \sqrt{11.8 - 0.1} \times 5$$

$$\sigma = \sqrt{11.79} \times 5$$

$$\sigma = 17.168$$

معیاری انحراف: توضیحات

معیاری انحراف، بکھراؤ کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پیمائش ہے، جو کہ سبھی قدروں پر مبنی ہے۔ اس لیے ایک بھی قدر میں تبدیلی معیاری انحراف کی قدر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ مبدا (Origin) سے آزاد ہے لیکن پیمانے سے نہیں۔ یہ بعض جدید شماریاتی مسائل میں بھی کارآمد ہے۔

4. بکھراؤ کی مطلق اور اضافی پیمائش

تمام پیمائشیں جو ابھی تک اوپر بیان کی گئی ہیں وہ بکھراؤ کی مطلق پیمائش ہیں وہ قدر کا شمار کرتی ہیں جس کی تشریح کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے لئے درج ذیل دو ڈیٹا سیٹ پر غور کریں۔

سیٹ A	500	700	1000
سیٹ B	1,00,000	1,20,000	1,30,000

مان لیجئے سیٹ A میں جو قدریں ہیں وہ آئس کریم بیچنے والے کے ذریعہ درج کی گئی یومیہ فروخت ہیں جبکہ سیٹ B میں

سے آزاد ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا موازنہ مختلف گروپوں جن میں پیمائش کی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، ان سے الگ ہٹ کر بھی کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح کواریٹائل انحراف کے یہ کواریٹائل انحراف کا ضریب ہے جو کہ درج ذیل طور پر شمار کیا جاسکتا ہے۔

$$\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$$

جہاں Q_3 تیسرا کواریٹائل = پہلا کواریٹائل

Q_1 = انحراف کے لیے یہ وسط انحراف کا ضریب ہے۔

$$\text{وسط انحراف کا ضریب} = \frac{M.D.(\bar{x})}{\bar{x}}$$

(وسطانیہ) M.D.
وسطانیہ

اس طرح اگر وسطی انحراف کا شمار وسط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے،

تب اس کی تقسیم وسطانیہ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

معیاری انحراف کے لیے اضافی پیمائش کو تغیر کا ضریب کہا

جاتا ہے جس کا شمار درج ذیل طور پر کیا جاتا ہے۔

معیاری انحراف

$$\frac{\text{معیاری انحراف}}{\text{حساب وسط}} \times 100$$

یہ عام طور پر فی صد اصطلاح میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ اور

انتشار کی اضافی پیمائش کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے چونکہ

اضافی پیمائش اکائیوں میں جن میں قدروں کا اظہار ہوتا ہے،

کمپنی کے ملازمین کی ماہانہ آمدنیاں ذیل میں دی گئی ہیں۔

جدول 6.4

متوسط آمدنی (X)	وسطی نقطہ (X)	کلاس کا تو اتر (Fx)	کل آمدنی	تواتر کا فیصد	کل آمدنی کا فیصد
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-5000	2500	5	12500	10	1.29
5000-10000	7500	10	75000	20	7.71
10000-20000	15000	18	270000	36	27.76
20000-40000	30000	10	300000	20	30.85
40000-50000	45000	7	315000	14	32.39
	50	972500	100		

جدول 6.5

مجموعی تواتر اور آمدنی سے کم

تواتر سے کم	مجموعی	مجموعی
5,000	10	1.29
10,000	3	9.00
20,000	66	36.76
40,000	86	67.61
50,000	100	100.00

4- ایک ساتھ تمام کلاسوں کی مجموعی آمدنی کا فی صد کے طور پر ہر طبقہ کی کل آمدنی کا اظہار کریں۔ اس طرح جدول 6.4 کے کالم 6 کو حاصل کریں گے۔

5- مجموعی آمدنی اور مجموعی تواتر سے کم تیار کریں جدول 6.5۔

6- جدول 6.5 کا کالم 2 ملازمین کا مجموعی تواتر دکھاتا ہے۔

7- جدول 6.5 کا کالم 3 ان لوگوں کی مجموعی آمدنی دکھاتا ہے۔

8- ایک خط (100, 100) کے ساتھ (0, 0) خط (Coordinates) کو ملائیے۔ حاصل شدہ خط مساوی تقسیم کا خط کہا جاتا ہے۔ شکل 6.1 میں خط OE کو دکھایا گیا ہے۔

9- افقی محور اور عمودی محور پر ملازمین کے مجموعی فیصد کی ترمیم کیجئے۔ اس طرح ہم اصل خط حاصل کر سکیں گے۔

لورینز منحنی کا مطالعہ

OC کو مساوی تقسیم کا خط کہا جاتا ہے چونکہ یہ ایک ایسی صورت حال کی دلالت کرتا ہے جیسے اوپری اوپری سطح کے 20% لوگ کل آمدنی کا 20% کماتے ہیں اور اوپری سطح کے 60% لوگ کل آمدنی کا 60% کماتے ہیں۔ اس خط سے منحنی OAC جتنا دور ہوگا اتنا ہی تقسیم کی غیر مساویت میں اضافہ ہوگا۔ اگر یکساں محوروں پر دو یا دو سے زیادہ منحنیاں ہیں تب جو CO خط سے زیادہ دور ہے تب وہاں سب سے زیادہ غیر مساویت (Inequality) رہے گی۔ تاہم، اگر دو یوریز منحنی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔

مثال کے طور پر لورینز منحنی ہمیں، آبادی کے فیصد اور اس کے حصہ کے درمیان تعلق کو میزانی شکل میں فراہم کرتا ہے۔ پہلے ہم ہر آمدنی کے گروہ میں آبادی کا فی صد اور اس کی میزان کا شمار کریں گے اور بعد میں آبادی کی میزان اور اس کے (آبادی کے) حصہ کے میزان کا فی صد ہمیں لارینز منحنی دیتا ہے۔

لورینز منحنی تیار کرنا

(Construction of Lorenz Curve)


درج مرحلے مطلوب ہیں۔

1- جدول 6.4 کے کالم 2 کو حاصل کرنے کے لیے کلاس وسطی نقطوں (Midpoints) کا حساب لگائیں۔

2- جدول 6.4 کے کالم نمبر 4 کے مطابق کلاس میں تعدد کے ذریعہ کلاس کے وسطی نقطوں کو گنا بڑھاتے ہوئے ہر کلاس میں ملازمین کی کل آمدنی کا حساب لگائیں۔

3- جدول 6.4 کے کالم 5 کے مطابق کل تواتر کے فی صد کے حساب سے تواتر کا اظہار کریں۔

قدروں کے ذریعہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈیٹا کے صرف وسطی 50% پر مبنی ہے تاہم MD اور S.D کی تشریح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دونوں اپنی اوسط سے قدر کے انحراف پر مبنی ہیں۔ MD یہ اوسط کے ذریعہ انحرافات کی اوسط کا شمار کرتا ہے۔ لیکن انحرافات کی علامتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اسی لیے یہ غیر ریاضیاتی دکھائی دیتا ہے۔ معیاری انحراف وسط سے اوسط انحراف شمار کرنے کی سعی کرتا ہے۔ MD کی طرح یہ سبھی قدروں پر مبنی ہے اور اس کا طلاق زیادہ جدید شماریاتی مسائل میں بھی کیا جاتا ہے۔ بکھراؤ کی پیمائش کے لئے اسے بڑے پیمانے پر استعمال کا جاتا ہے۔



6. اختتام

اگر چرخی کو شمار کرنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہے تاہم اس پر انتہائی قدروں کا بے جا اثر پڑتا ہے۔ Q-D (کواریٹائل انحراف) انتہائی

خلاصہ

- بکھراؤ کی پیمائش کسی معاشی متغیر کی کیفیت کے بارے میں ہماری فہم کو بہتر بناتی ہے۔
- رینج اور کواریٹائل انحراف قدروں کے پھیلاؤ پر مبنی ہیں۔
- MD (وسط انحراف) اور SD (معیاری انحراف) اوسط کی قدروں کے انحرافات پر مبنی ہیں۔
- بکھراؤ کی پیمائش مطلق یا اضافی ہو سکتی ہے۔
- مطلق پیمائش اکائیوں میں جواب فراہم کرتی ہیں جن میں ڈیٹا کا اظہار کیا جاتا ہے۔
- اگر مطلق قدر کا موازنہ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اضافی پیمائش ان اکائیوں سے آزاد ہوتی ہیں۔
- اضافی متعلقہ پیمائش اکائیوں سے آزاد ہوتی ہیں۔ اس لیے مختلف متغیروں کے تقابل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- ایک ترمیمی طریقہ منحنی کے انحراف کا اندازہ قائم کرتا ہے، لوریٹز منحنی کہلاتا ہے۔

مشقیں

1. ایک تعددی تقسیم کو سمجھنے میں بکھراؤ کی پیمائش مرکزی قدر کا ایک بہتر نکتہ ہے۔ تبصرہ کیجئے۔
2. بکھراؤ کی کون سی پیمائش بہتر ہے اور کس طرح؟
3. انحراف کی چند پیمائش قیمتوں کے پھیلاؤ پر منحصر ہوتی ہے جبکہ چند مرکزی قیمت سے قیمتوں کی تبدیلی پر منحصر ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟
4. ایک قصبے میں 25% افراد 45,000 روپے سے زیادہ کماتے ہیں جبکہ 75% افراد 18,000 روپے سے زیادہ کماتے ہیں۔ بکھراؤ کی مطلق اور اضافی قدروں کا شمار کیجئے۔
5. ریاست کے 10 اضلاع کے لئے گیارہوں کی فی ایکڑ پیداوار درج ذیل ہے:

ضلع	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
گیارہوں	12	10	15	19	21	16	18	9	25	10
چاول	22	29	12	23	18	15	12	34	18	12
شمار کیجئے										

(i) رینج

(ii) کواریٹائل انحراف (Q.D)

(iii) وسط کے بارے میں وسط انحراف

(iv) وسطانیہ کے بارے میں وسط انحراف

(v) وسط انحراف

(vi) کسی فصل میں زیادہ تغیر ہے۔

(vii) ہر فصل کے لئے مختلف پیمائشوں کی قدروں کا موازنہ کیجئے۔

6. پچھلے سوال میں تغیر کی اضافی پیمائشوں کا شمار کیجئے اور قدر ظاہر کیجئے جو کہ آپ کی رائے میں زیادہ معتبر ہے۔

7. ایک بلے باز کو ایک کرکٹ ٹیم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے پچھلے اسکور پانچ ٹسٹ میچوں کے بنیاد پر X اور Y کے درمیان انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ اسکور درج ذیل ہیں:

120	80	40	85	25	X
80	45	65	70	50	Y

اگر ہم چاہتے ہیں تو کون سے بلے باز کو منتخب کیا جانا چاہئے۔

(i) زیادہ رن حاصل کرنے والے کو

(ii) ٹیم میں ایک زیادہ معتبر بلے باز

8. روشنی کے بلبوں دو برانڈوں کی کوالٹی کی جانچ کرنے کے لئے ان کے جلنے کے گھنٹوں کی مدت کا تخمینہ ہر برانڈ کے 100 بلبوں کے لئے درج ذیل طور پر لگایا گیا تھا۔

بلبوں کی تعداد		مدت (گھنٹوں میں)
برانڈ B	برانڈ A	
2	15	0-50
8	20	50-100
60	18	100-150
25	25	150-200
5	22	200-250
100	100	

(i) کون سا برانڈ زیادہ مدت چلتا ہے؟

(ii) کون سا برانڈ ایسا ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔

9. ایک فیکٹری میں 50 ورکرس کی اوسط یومیہ مزدوری 40 روپے کے معیاری انحراف کے ساتھ 200 روپے تھی۔ ہر ورکر کی مزدوری میں

20 روپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ نئی اوسط یومیہ مزدوری اور معیاری انحراف کیا ہوگا؟ کیا مزدوریوں میں زیادہ یا کم یکسانیت ہو جائے گی؟

10. اگر پچھلے سوال میں ہر ورکر کی اجرتوں میں 10% کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وسط اور معیاری انحراف قدریں کس طرح متاثر ہوں گی؟

11. درج ذیل تقسیم کے لئے وسط اور معیاری انحراف کے بارے میں وسط انحراف کا شمار کیجئے۔

تواترات	کلاسز
3	20-40
6	40-80
20	80-100
12	100-120
9	120-140
50	

12. قدروں کی جمع 100 ہے اور ان کے مربع کی جمع 1090 ہے۔ تغیر کا ضریب دریافت کیجئے۔